

जीव-जगत

लेखक

सुरेश सिंह

प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश

प्रथम गहरण

१०५८

सूच्य

चौदह दपपा

मुद्रक

१० पृष्ठीनाथ भार्गव,

भारत भूषण प्रेम गायधाम वाराणसी

पूज्य श्री सम्पूर्णानन्द जी
को
सादर समर्पित

—सुरेश सिंह

प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है । हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ प्रकाशित करना चाहते हैं जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं हो पाता । हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी और भारती के भण्डार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का वासन भी किञ्चित् योगदान देने में समर्थ होगा ।

भगवती शरण सिंह

सचिव, हिन्दी समिति

पूज्य श्री सम्पूर्णानन्द जी
को
सादर समर्पित

—सुरेश सिंह

तवागु	Slender Loris	७२०
वानर उपवर्ग	<i>Sub-order Anthropoda</i>	७२०
वानर परिवार	Family Cercopithecidae	७२१
बन्दर	Monkey	७२१
लंगूर	Langur	७२३
लील-वानर	Lion-tailed Monkey	७२६
ऊलक परिवार	Family Simiidae	७२५
ऊलक वनमानुष	White Browed Gibbon	७२५

रंगीन चित्रों की सूची

१. छविक (जेलीफिश)
२. प्रवाल द्वीप की मछलियाँ
३. शंखों के कुछ सुन्दर नमूने
४. टिट्ठों का समूह
५. तितलियाँ
६. दंशनी हांगर (शार्क मछली)
७. भूँगे की चट्टानों वाला प्रवाल द्वीप
८. कबरा गोह
९. धामिन तथा नाग
१०. फुदकी तथा नीलकंठ
११. ठठेरा तथा कठफोर
१२. फुलचुही तथा पीलक
१३. उड़नेवाली गिलहरी
१४. शिखायुक्त साही
१५. वाघ
१६. तेंदुआ
१७. गादुर

जीव-जगत

भाग १

अमेरुदंडीय उपजगत

SUB KINGDOM INVERTEBRATA



छत्रिक (जेलीफिश पृ० १८)

भरल का बदन उरियल में कुछ बड़ा और न्यान में कुछ छोटा होता है। इसके सिर उरियल और न्याय की तरह बहुत मोटाई में न घूम कर बाहर की ओर फैल-फैल रहने हैं। नर के सींग मादाओं में बड़े होने हैं।

इनके बदन का ऊपरी भाग सिलेटी और निचला धुर सफेद रहता है लेकिन जान में बदन के सिलेटीपन में कुछ भूरापन आ जाता है। नरों का चेहरा और दुम का आधा से ज्यादा भाग काला रहता है। इनके चारों पैरों के अगले भाग तथा पेट के दोनों बगल एक एक काली पट्टी पट्टी रहती है।

यह भी गरोह में रहनेवाले जानवर हैं। इन गरोहों की तादाद कभी-कभी सीमा तक की हो जाती है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।

भरल को मादा अन्य भेड़ ववरियों की तरह, पाँच महीने पर गरमिया में एक या दो बच्चे जनती है।

गुरल उपपरिवार

(SUB FAMILY RUPICAPRIINAE)

इस उपपरिवार में गुरल के अलावा अपने यहाँ के प्रसिद्ध सेराव को रखा गया है। यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन दिया जा रहा है।



गुरल

गुरल

(GURAL)

गुरल को पहाड़ी हिरण कहना ठीक होगा। ये पहाड़ों पर की बड़ी आबादियों के आस-पास काफी तादाद में पाये जाते हैं और प्रतिवर्ष इनका काफी मर्या में शिकार होता है। हिमालय में ये कश्मीर से भूटान तक पाये जाते हैं जहाँ तीन हजार से आठ हजार फुट

की ऊँचाई के जंगलों में इन्हें बड़ी आसानी से देखा जा सकता है।

गुरग की धनपाय धनरो-देसी होती है। ये चार फुट लम्बे और दो ऊँचे फुट ऊँचे होते हैं। इनके नर और मादा के शरीर जैसे सींग होते हैं, लेकिन ऊँचाई में नर के सींग कुछ बड़े होते हैं। ये शरीर चारपाय का छोटा चिराई बनाकर रहते हैं और उन्हें लोगों के लेंके-सीने और फासीय भागों से पकड़ आते हैं।

गुरग का रंग गंधावन दिने हल्के सिलेटीमाकल भूरा रहता है जो नीचे जाने-जाने और भी हल्का हो जाता है। पीठ पर काली चट्टी रहती है और गला सफेद रहता है। इसका मुख्य भोजन घास-पान है।

मादा अन्य जेड-नकरियों की तरह पान-ल गतीने पर एक बच्चा जनती है। गुरग का मान बहुत स्थायित और कामन्द होता है।

सेराव

(SEROW)

सेराव को बकरे और हिरन के बीच का जान्य कहें तो ज्यादा ठीक होगा। यह हमारे यहाँ हिमालय के पश्चिमीनर प्रायों में छः से बारह हजार फुट की ऊँचाई पर पाया जाता है।

सेराव बहुत सीधा-मादा जानवर है। इनका बिर बड़ा और कद भारी होता है। इसके बाल कड़े और पतले होते हैं, जो ज्यादा लम्बे नहीं रहते। गरदन के ऊपर बड़े बालों की अयाल-सी रहती है।

सेराव लगभग पाँच फुट लम्बा और तीन फुट ऊँचा जानवर है जिसका ऊपरी हिस्सा कलछीह गाढ़ा सिलेटी होता है। इसका सिर और गरदन काली, बगली हिस्से, सीना और रानें कलछी और नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। नर और मादा दोनों

सींगदार होते हैं, लेकिन नर का सींग मादा से कुछ बड़ा, लगभग १० इंच का रहता है। सेराव घने जंगलों में रहनेवाला शरमीला जानवर है, जो ऊँची-नीची पहाड़ियों के आस-पास रहता है। यह खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में उस्ताद होता है।



सेराव

मेराव रंगे तो गोपा और डगपोर जानवर है, किन्ति धायल होने पर यह वडा भयानक हमला करता है। इनका मांस मूगा और मामूली होता है।

जाटों में डगरी मादा एन बच्चा देती है।

मूग उपपरिवार

(SUB FAMILY ANTHOPIDAE)

मूग उप-परिवार में मूग और चिबागा आते हैं। ये दोनों ही अपने वहाँ के प्रसिद्ध जीव हैं। यहाँ इन दोनों का वर्णन दिया जा रहा है।

मूग

(BLACK BLACK)

मूग अपने वहाँ का सबसे प्रसिद्ध हिमन है। यह हमारे वहाँ हिरन के नाम से प्रसिद्ध है, रंगे तो इसके कानिया और कृष्णमास आदि कई नाम हैं।

मूग हमारे वहाँ सारे देश में फैले हुए हैं जो ऊँची नीची पहाड़ियों से ज्यादा जगलों के आम-गाम के गुले मैदानों को पसन्द करते हैं। कहीं-कहीं तो ये रोज की तरह पहाड़ी और जंगल से दूर गुले मैदानों में रहने लगे हैं।

मूग चार फुट लम्बे और लगभग ढाई-मीन फुट ऊँचे होते हैं। मादाएँ कुछ छोटी होती हैं और उनके सींग नहीं होते। नर के सिर पर पन्ने-हीम इव लम्बे सींग होते हैं जो धरातीदार और सीधे होते हैं। इन सींगों के कारण नर बहुत सुन्दर लगते हैं।

मूग के शरीर का ऊपरी और पैर का बाहरी हिस्सा भूरा या बादामी होता है लेकिन नीचे का कुल हिस्सा धुर सफेद रहता है। नर ज्यों ज्यों पुराने होते जाते हैं उनका ऊपरी भूरा हिस्सा कलछीह होता जाता है।

मूग गरोह बाधकर रहने हैं और अक्सर इनके पचीस-नीस के गरोह दिखाई पड़ते हैं जिनमें एक बाला नर रहता है। ये बहुत तेज भागनेवाले जीव हैं जो भागने समय बहुत लम्बी छलांगें मारते हैं जिसे हम चौकड़ी भरना कहते हैं।

मूग बहुत डीठ जानवर है। जहाँ इनका गिबार नहीं होता वहाँ तो ये रोज़ा की तरह डीठ हो जाते हैं और हमारी खेती का बहुत नुकसान करते हैं। इनकी चराई का

कोई निश्चित समय नहीं है और ये अपनी सुविधा के अनुसार दिन भर चरते रहते हैं। दिन में ये जहर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं और रोझों की तरह प्रायः एक ही स्थान पर रोज़ बिठा करते हैं।



मृग

मादा प्रायः अगस्त अथवा सितंबर में एक बच्चा जनती है। इनका मांस कुछ खाया जरूर होता है, लेकिन वह स्वादिष्ट भी कम नहीं होता।

चिकारा

(INDIAN GAZELLE)

चिकारा को कहीं चिकारा या कलपुंछ कहते हैं तो कहीं छिकारा या छिगार। ये मृगों से कद में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन सुन्दरता में उनसे कम नहीं कहे जा सकते।

ये हमारे यहाँ के पूर्वी हिस्से को छोड़कर सारे देश के जंगलों में पाये जाते हैं।

इनके नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। नर के सींग धरातीदार रहते हैं, लेकिन

मादा सादे और छोटे सींगोवाली होती है।



चिकारा

ऊरड-वावड जमीन और पहाड़ियाँ पसन्द है। ये खेतों के आस-पास कम दिखाई पड़ते हैं और हमारी खेती का ज्यादा नुकसान भी नहीं करते। खतरा निकट आने पर ये एक प्रकार की तेज मिमकारी भरते हैं और अपने अगले पैरों को जमीन पर पटकते हैं।

इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।

रोझ उपपरिवार

(SUB FAMILY TRAGELAPHINAE)

इस उपपरिवार में भी अपने यहाँ के दो प्रसिद्ध जानवर रोझ और चोमिंगा रखे गये हैं। रोझ ता अब जंगलों के अलावा हमारे खेतों और आबादियाँ के निकट रहने के आदी हो गये हैं, लेकिन चोमिंगा जंगलों में ही पाया जाता है।

यहाँ दोनों का वर्णन दिया जा रहा है।


चिकारा के नरों के ऊपरी समस्त हिस्सा और टांगों का बाहरी हिस्सा हलके खैरे रंग का होता है लेकिन नीचे का सारा भाग सफेद ही रहता है।

चिकारे मृगों की तरह बड़े झुंड बनाकर नहीं रहते। ये जोड़े में या चार-छ एक साथ रहते हैं। ये बहुत तेज भागने वाले होकर भी मृगों की तरह चौकड़ी भरने के शौकीन नहीं हैं। इसी से इन्हें खुले मैदानों में ज्यादा

रोझ

(BLUE BULL)

रोझ हमारे यहाँ नीलगाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके नाम के साथ गाय शब्द जुट जाने से हमारे यहाँ कहीं-कहीं लोग इनको नहीं मारते। लेकिन ये वास्तव में एक प्रकार के हिरन हैं जो हमारे खेतों के आस-पास छोटे-छोटे गरोहों में घूमते दिखाई पड़ते हैं। हमारे देश में ये बंगाल और आसाम को छोड़कर करीब-करीब सारे देश में पाये जाते हैं और अपनी दिठाई के कारण जंगलों के अलावा मैदानों और खेतों में घूमते रहते हैं। इनसे हमारी खेती को बहुत नुकसान पहुँचता है।



रोझ

रोझ काफी ऊँचे और भारी भरकम होते हैं जिनकी लम्बाई लगभग सात फुट और ऊँचाई पाँच फुट के करीब रहती है। नर के आठ-नौ इंच के छोटे सींग रहते हैं, लेकिन मादाएँ बिना सींग के ही होती हैं। नर जवान होने पर पिलछोँह या काले हो जाते हैं और इनके गले पर वालों का एक गुच्छा-सा निकल आता है।

रोझ के पिछले पैर अगले पैरों से कुछ छोटे होते हैं। इससे इनका अगला हिस्सा कुछ उठा-सा रहता है। इनका ऊपरी हिस्सा भूरा और नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। इनका मुख्य भोजन घासपात है, लेकिन मैदानों में रहनेवाले रोझ ज्यादातर खेतों पर

ही हमला करते हैं। ये दिन को किमी निरापद स्थान में बैठकर आराम करते हैं और प्रायः एक ही जगह नित्य बिछा करते हैं।

इनकी मादा आठ-नी महीने पर एक या दो बच्चे जनती है। इनका मांस बकरी, मसूली और रुखा होता है।

चौसिंगा

(FOUR HORNED ANTILOPE)

चौसिंगा चार सींगोंवाला हिरन है जैसा इसके नाम में स्पष्ट है। हमारे देश में यह हिमालय की तराई, मध्य प्रदेश, राजपूताना, वबई और पंजाब के जंगली हिस्सों में पाया जाता है।



चौसिंगा

इसके नर-मादा एक ही रंग के होते हैं लेकिन सींग केवल नरों के ही रहते हैं। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा वादामी भूरे रंग का और नीचे का सफेद रहता है। पीठ पर बं भूरे रंग में एक प्रकार की छलाई मिली रहती है। इसकी लम्बाई तीन मादों तीन फुट से ज्यादा नहीं होती और ऊँचाई में भी यह दो सवा दो फुट का रहता है। मादा नर में कुछ छोटी होती है।

चोंसिंगा तितरे-वितरे जंगलों का निवासी है जिसे घने जंगल और ऊँचे पहाड़ पसन्द नहीं आते। यह अपनी शकल-सूरत में ही नहीं, अपनी आदतों में भी हमारे यहाँ के अन्य हिरनों से निराला होता है।

चोंसिंगा बहुत शरमीला हिरन है जो प्रायः जोड़े में ही दिखलाई पड़ता है। यह गरोह नहीं बनाता और प्रायः पानी के आस-पास ही रहता है।

इसका मांस हल्का होने पर भी स्वादिष्ट होता है। मादा पाँच-छः महीने पर जनवरी-फरवरी के आस-पास एक या दो बच्चे देती है।

वारहसिंघा-परिवार

(FAMILY CERVIDAE)

वारहसिंघे अपने सुन्दर और शानदार बड़े सींगों के कारण अन्य हिरनों से अलग व्यक्तित्व रखते हैं। इनका परिवार काफी बड़ा है। इनकी कई जातियाँ हमारे देश में पायी जाती हैं।

इन जीवों के प्रायः सभी नरों के लम्बे सींग होते हैं जिनमें अनेक शाखें फूटी रहती हैं। ये सींग हर साल या कई साल पर एक बार गिर जाते हैं और उनके स्थान पर नये सींग निकल आते हैं। नये सींगों की वाढ़ इतनी तेजी से होती है कि तीन-चार महीने के भीतर ही ये पहले जैसे हो जाते हैं। गुरु में तो ये नये सींग मुलायम रहते हैं और इनकी सतह मखमल जैसी होती है, लेकिन वाढ़ पूरी हो जाने पर यह खाल सूखकर चमड़े जैसी कड़ी हो जाती है। इस समय इनमें बड़ी खुजलाहट उठती है और तब ये पेड़ की डालों से अपने सींग रगड़कर इस खाल को छुड़ा डालते हैं।

उत्तरी गोलार्द्ध के वरफीले देश के रेनडियर नाम के वारहसिंघे को छोड़कर बाकी सब वारहसिंघों में केवल नर के ही बड़े सींग रहते हैं। मादाएँ कद में नर से कुछ छोटी होती हैं। ये जीव भारी भरकम होने पर भी बहुत तेज भागते हैं। इसी कारण इनका शरीर भी बहुत सुन्दर और गठा हुआ रहता है।

इसी परिवार में एक कस्तूरा नाम का जीव भी है जिसके सींग नहीं होते और जिसके नर की दुम के नीचे एक थैली या ग्रन्थि रहती है। इसी थैली से एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसे हम कस्तूरी या मुश्क कहते हैं।

यहाँ अपने देश के कुछ प्रसिद्ध वारहसिंघों का वर्णन दिया जा रहा है।

बारहसिंघा

(BARASINGHA)

हमारे यहाँ का प्रसिद्ध बारहसिंघा माहा कहलाता है। इसने प्रत्येक छ-छ शाखें फूटी रहती हैं। इसीलिए इसे बारहसिंघा का नाम मिला है जो ठी देश में ये हिमालय की तराई तथा मध्यप्रान्त के जंगलों में पाये जाते हैं।



बारहसिंघा

बारहसिंघा बहुत सुडौल होता है। इसके शरीर के बाल कड़े और मोटे होते जो गरदन के पास काफी बड़े हो जाते हैं। इसकी दुम छोटी होती है। यह घुड़ में र वाला जानवर है जो गरमिया में अकेले ही रहना पसन्द करता है, लेकिन जाड़े में बड़े-बड़े गरोह वन जाते हैं। इन्हे घने जंगलों से ज्यादा तितरे-बितरे जंगल और घास के मैदान पसन्द आते हैं जिनके बीच-बीच में पेड़ हों।

वारहसिंघा चार फुट से कुछ कम ऊँचा और लगभग छः फुट लम्बा होता है। इसके सींग भी करीब तीन फुट के हो जाते हैं जिनमें शाखें फूटी रहती हैं। गरमी और जाड़ों में इनके शरीर का रंग बदल जाता है। जाड़ों में इनका ऊपरी हिस्सा वादामी रहता है तो गरमियों में वह खैरा हो जाता है और उस पर अक्सर सफेद चित्तियाँ पड़ जाती हैं। पैद, गला और टाँगों का भीतरी हिस्सा सफेद या सफेदी मायल रहता है; दुम के नीचे का हिस्सा हमेशा सफेद रहता है। मादा का रंग नर से हलका रहता है, लेकिन वच्चे चित्तीदार रहते हैं।

वारहसिंघों के जोड़ा बाँधने का समय फरवरी से मार्च तक रहता है। इसी समय इनके गिरे हुए सींगों के स्थान पर नये और सुन्दर सींग निकल आते हैं।

इनका मुख्य भोजन घास-पात है। ये रात में चराई करके दिन में किसी निरापद स्थान पर बैठकर आराम करते हैं। इनका मांस रुखा और स्वादिष्ठ होता है।

हंगल

(KASHMIRE STAG)

हंगल कश्मीरी वारहसिंघा है। यह कश्मीर के जंगलों के सिवा और कहीं नहीं पाया जाता। वहाँ यह चीड़ के जंगलों में अधिक पाया जाता है और गरमियों में वारह हजार फुट की ऊँचाई तक चढ़ जाता है।

हंगल वारहसिंघों में सबसे भारी होते हैं। इनके नर सींगदार होते हैं, जिनके प्रत्येक सींग में प्रायः पाँच शाखाएँ फूटी रहती हैं। कभी-कभी छः शाखाओंवाले सींग के हंगल भी पाये जाते हैं। ऊँचाई में ये चार, सवा चार फुट और लम्बाई में सात, साढ़े सात फुट तक के हो जाते हैं। इनके सींग भी लगभग तीन फुट लम्बे होते हैं। नर की गरदन पर ऊपर तथा नीचे बड़े-बड़े बाल रहते हैं।

हंगल के वदन का रंग भूरापन लिये राखी होता है जिसमें दुम के चारों ओर का हिस्सा सफेद रहता है। वगल के हिस्से और पैर हलके रंग के होते हैं। गरमियों में हंगलों का रंग चमकीला रहता है और उसमें ललाई अधिक रहती है। वच्चे चित्तीदार होते हैं जिनकी चित्तियाँ कई साल में गायब हो जाती हैं।

हंगल भी गरमियों में अकेले या छोटे-छोटे गरोहों में हो जाते हैं, लेकिन जाड़ा आने पर ये अपना बड़ा गरोह बना लेते हैं। नर मार्च के लगभग अपने सींग गिराते

है जो अत्यन्त हीन और निम्न आदि है। यह व मायका मायानन्द जो इस दीन का समस्त प्रीति का जगत् है। उस मायका जगत् नरम वा कषायक बन गया है। इसका मायका मन्त्र दया है। अर्थात् मन्त्राई यन्त्राई है जो दया का मायका मन्त्राई जगत् बना है।



हगल

हगल का मुख्य भाजन घाम-पात है। इस हगल घन जगत्पमन्द है जिनका घाम-पमन्द म हरी घाम का मदान और पानी के चमक है। यह एक स्थान पर रहता पमन्द नहीं करता और इस उधर चक्कर लगाता रहता है। इनकी मान्यता का भित्तिपानार कहते हैं जो उगमग छ मदान पर अग्रत करीब बसत जनता है।

सांभर

(SAMBAR)

सांभर हमारे यहां का सबसे प्रसिद्ध नारदसिद्ध है। जिनका इनका प्रत्यक्ष सींग म छ के बजाय तान ही गांवाए रहती है। हमारे देश म यह प्राय सभी पहानी जगलो म काफी बड़ी संख्या म फल हुआ है। यह हिमालय की आर आठ दस हजार फुट तक की

ऊँचाई पर पाये जाते हैं, लेकिन इनके रहने के मुख्य स्थान ऊँचे-नीचे पहाड़ी जंगल हैं। इन्हें खुले हुए पहाड़ और मैदान पसन्द नहीं आते। पहाड़ी जंगलों में ये इतना भारी गरीर लेकर इस सूत्री से भागते हैं कि देखकर बड़ा अचरज होता है।

साँभर हमारे यहाँ के बाग़्हामिषों में सबसे बड़े होते हैं। ये पाँच फुट ऊँचे और मात-आठ फुट लम्बे होते हैं, लेकिन मादा कद में कुछ छोटी और दिना सींगों की होती है। नर के सींग तीन से चार फुट तक लम्बे होते हैं जिनमें तीन शाखाएँ फूटी रहती हैं।



साँभर

साँभर अपना ज्यादा समय जंगलों में ही बिताते हैं। इनका इतना अधिक शिकार होता है कि ये रोड़ों की तरह ढीठ न होकर हमेशा बहुत चौकन्ने रहते हैं। ये जंगल

वे घीब के मैदानों में अक्सर साँझ-सवेरे चरते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन इनकी चराई का असली समय रात ही है। ये जंगल के पास-पड़ोस के खेतों का बहुत नुकसान करते हैं।

साँभर ज्यादा बड़े झुंड नहीं बनाते और अक्सर चार छ से दस-बारह के गरोह में ही रहना पसन्द करते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है लेकिन इसके अलावा ये जंगली फल फूल और नरम कल्ले भी बड़े मजे में खाते हैं। इनके जोड़ा बाँधने का समय अक्टूबर-नवम्बर है जब ये अपना गरोह बड़ा कर लेते हैं। इन्हीं दिनों नर बैला की तरह बोलते हैं।

साँभर के सींग मार्च के करीब गिर जाते हैं और अक्टूबर तक फिर नये सींग निकल आते हैं। यही समय इनके जोड़ा बाँधने का है। कहीं-कहीं साँभर हर साल सींग नहीं गिराते और उनके सींग गिराने का समय हर दूसरे साल आता है।

साँभर के शरीर का रंग कृपई रहता है जो नीब की ओर हल्का हो जाता है। मादा कद में नर से कुछ छोटी और बिना सींगवाली होती है। यह पाँच-छ महीने पर बच्चे देती है।

अन्य बारहसिंघों की तरह इसका मांस भी रुखा और स्वादिष्ट होता है।

चीतल

(SPOTTED DEER)

चीतल जैसा इसका नाम से ही स्पष्ट है, चित्तीदार बारहसिंघा है। यह बंद में छाटा होने पर भी मुन्दरता में सबसे आगे है। इसको चिनरा और झोक भी कहते हैं। हमारे देश में यह पंजाब और राजपूताना का छोड़कर प्रायः सभी जंगलों में पाया जाता है। इसे वैसे ताँतरी के जंगल ही पसन्द हैं लेकिन यह हिमालय और दक्षिण के पहाड़ों पर भी तीन चार हजार फुट तक की ऊँचाई पर दया जा सकता है।

चीतल लगभग पाँच फुट लम्बा और तीन, गवा तीन फुट ऊँचा होता है। इनका नर के करीब तीन फुट लंबे सींग होते हैं जो तीन सालाआवाजे होत हैं। इनके शरीर का रंग बादामी होता है जिस पर सफेद चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा, पेट तथा टाँगा का भीतरी भाग सफेद रहता है। गिर का रंग भूरा रहता है जिस पर चित्तियाँ नहीं होती।

चिड़िया भी बुरी, कोराक बलदेवका - कहता है - जिसके हाथ लकीर-बकी मोन्नी का केरी पाले है। उसे बलदेवका के आलसका के हाथी कीन घोस में भरे हुए गगन बहुत पसन्द आते हैं। जैसे ही वह मोन्नी की तरफ पार में दूर चाल-चाल करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके चारों ओर भय भयका रहता है। यह दिनों में आकाश करने काम को फिर बारी के हैं वह निरुद्ध रहता है।



चीतल

इसके जोड़ा बांधने का समय वैसे तो शितम्बर है, लेकिन यह बीच में भी जोड़ा बांध लेता है। इसी तरह इसके मींग गिरने का भी कोई निश्चित समय नहीं है। इनकी बोली बड़ी तेज होती है। चितली छः-आठ महीने पर एक या दो बच्चे जनती है।

इसका मांस सूखा और स्वादिष्ट होता है।

पाढा

(HOG DEER)

पाढे को छोटा बारहसिंघा कहना ठीक होगा। इसे कहीं-कहीं लगुना या खरल-गुना भी कहते हैं। हमारे देश में ये हिमालय की तराई में काफी संख्या में पाये जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण की ओर सोन नदी तक के ऊँचे नीचे हल्के जंगल, बछारा और पास के मैदानों में भी कभी-कभी मिल जाते हैं।



पाढा

पाढा दो फुट से ज्यादा ऊँचा और साढ़े तीन फुट से ज्यादा लम्बा नहीं होता है। मादा इससे भी छोटी होती है। नरों के सींग होते हैं जो लगभग एक फुट लम्बे और तीन-तीन शाखाओंवाले रहते हैं। ये अपने सींग मार्च-अप्रैल में गिराते हैं।

पाढा के बदन का ऊपरी हिस्सा भूरा, हल्का कटुई या बादामी होता है। नीचे का हिस्सा हल्के रंग का रहता है। दुम का निचला हिस्सा सफेद रहता है। परमियों में पाढे का रंग हल्का हो जाता है और दोनों बगली हिस्से पर हल्के भूरे या सफेद रंग

की चित्तियाँ पड़ जाती हैं जो दूर से धारी-सी जान पड़ती हैं। वच्चे पाँच-छः महीने तक चित्तीदार रहते हैं।


पाड़े झुंड बनाकर नहीं रहते। ये अक्सर अकेले या दो-तीन एक साथ दिखाई पड़ते हैं। ये जाड़ों में जोड़ा बाँधते हैं और मादा सात-आठ महीने बाद वच्चा देती है।

इसका मांस रुखा और स्वादिष्ट होता है।

काकड़

(BARKING DEER)

काकड़ वारहसिंघे का भाई-बन्धु है, लेकिन इसके सींगों में थोड़ा फर्क रहता है। इसके सींग वारहसिंघे के सींगों की तरह हर साल या कई साल पर गिरते जरूर हैं लेकिन पूरे सींग न गिरकर सींगों का थोड़ा-सा ऊपरी हिस्सा ही गिरता है।



काकड़

काकड़ हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध जानवर है जो हमारे यहाँ की सभी जंगलोंवाली पहाड़ियों पर पाया जाता है। मध्यप्रान्त और पश्चिम की ओर इसकी संख्यां जरूर बहुत

कम है। इसे मैदान पसन्द नहीं। इसीलिए यह हिमालय पर भी पाँच छ हजार फुट तक चरा जाता है।

काकड दो फुट से कुछ कम ही ऊँचा होता है और उसकी लम्बाई भी तीन फुट से ज्यादा नहीं होती। नर के सींग सात-आठ इंच के रहने हैं जिनमें दो गांथाएँ रहती हैं। मादा बिना सींगों की होती है। इसका रंग गाढ़ा काला रहता है जो ऊपर काला और नीचे हल्का हो जाता है। चेहरा और पैर हलके भूरे रंग के रहने हैं और गल का ऊपरी हिस्सा पेट और दुध का निचला हिस्सा सफेद रहता है। बच्चे चित्तीदार होते हैं।

काकड इतनी तेज आवाज करता है कि सहसा यह विश्वास ही नहीं होता कि इतना छोटा जानवर ऐसी तेज आवाज करेगा। इसकी आवाज मन्त्रों की भाँति ही पड़ती है लेकिन जोड़ा बाँधने के समय हम उसे अक्सर सुन सकते हैं। यह गराह नहीं बनाता और अक्सर अकेला या जोड़ा बनाकर ही रहता है। इसे मैदान में ज्यादा घने जंगल पसन्द हैं, जहाँ से यह भिन्न चराई के समय ही बाहर निकलता है। चरते समय यह जंगल से दूर नहीं जाता और जरा-सा आहट पाते ही फिर जंगल में घुस जाता है। भागते समय यह अपना सिर नीचा करके और पिछला हिस्सा उठाकर बड़े बेडों की तरह से चलता है।

काकड का मुख्य भोजन घास-प्रात है लेकिन पालतू हा जानने पर यह पका हुआ गोबर तक खा लेता है। इसके कुबुरदंत बहुत तेज होते हैं जिनसे यह दबाव में पड़ने पर कभी कभी काट भी लेता है। इसकी जवान बहुत लम्बी होती है जिससे यह अपना बहरा घाटना रहता है।


काकड के जोड़ा बाँधने का समय जनवरी, फरवरी है। इसकी मादा करीब पाँच महीने पर एक या दो बच्चे देती है। इसका मांस खूब किन्तु स्वादिष्ट होता है।

कस्तूरी-मृग

(MUSK DEER)

कस्तूरी मृग वारहगिषा परिवार का होकर भी बिना सींग का ही हिस्सा है। इसे इसका मुस्क या कस्तूरी के कारण ही कस्तूरी-मृग कहा जाता है। इसे बरमौर में रोस और गडवा में वेना या मस्कनामा कहते हैं लेकिन इसका कस्तूरी मृग नाम सब से प्रसिद्ध है।

कस्तूरी-मृग हमारा बहुत ही परिचित मृग है जो अधिकतर हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। यह आठ हजार फुट से ऊँचे जंगलों में ही रहता है। इस मृग की ऊँचाई दो फुट से कम ही रहती है और लम्बाई में भी यह तीन फुट से ज्यादा नहीं होता। इसके बदन का रंग गाढ़ा भूरा रहता है जिस पर कहीं-कहीं मिलेटी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। नीचे का हिस्सा हल्का रहता है और रानों का भीतरी हिस्सा सफेदी मायल रहता है। किसी-किसी के गाल के दोनों ओर एक-एक सफेद गोल चित्ता पड़ा रहता है। बच्चों के बदन पर सफेद या पिन्कीह चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।



कस्तूरी-मृग

कस्तूरी-मृग के बदन के बाल अजीब बनावट के होते हैं। ये लम्बे और कड़े तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें लहर-सी पड़ी रहती है और उनका निचला हिस्सा सफेद रहता है। इसकी टाँगें लम्बी होती हैं और अगली से पिछली टाँगें बड़ी रहती हैं। इसीलिए इसकी चाल खरगोश या कंगारू की तरह लगती है।

कस्तूरी-मृग अकेला रहनेवाला जानवर है जो गरोह नहीं बाँधता। यह जोड़े के साथ भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। इसे घने, ऊँचे और ढलुवे जंगल बहुत पसन्द हैं जिन पर यह बड़ी फुर्ती से चढ़-उतर लेता है। इसकी चराई का समय सुबह-शाम है। दिन को यह जमीन में आराम करने के लिए गढ़ा-सा खोद लेता है और उसी में बैठकर सारा दिन काट देता है। इसका मुख्य भोजन घास-पात है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।

कस्तूरी-मृग के जोड़ा बाँधने का समय जाड़ा है, जब नर के पेट के पाम की ग्रन्थि में एक प्रकार का गाढ़ा बलछोह मुगन्धित पदार्थ जमा हो जाता है। यही कस्तूरी या मुस्क है जो बहुत कीमती वस्तु है। गाढ़ा करीब पाँच महीने बाद एक या दो बच्चे जनती हैं।

पिसूरी-समूह

(SECTION TRAGULINA)

इस छोटे समूह में केवल एक ही घन हमारे यहाँ पाया जाता है। इसके जीव बंद में बहुत छोटे होते हैं और इनके मिर पर भोग नहीं होते। इनके उदर साफ बाँ के अन्य जीवों के उदर की तरह चार खानेवाले न होकर तीन ही खानेवाले होते हैं और नर प्राणियों के कुशुरदन्त काफी बड़े होते हैं।

इस समूह में केवल एक ही परिवार है जो पिसूरी-परिवार (Family Tragulidae) कहलाता है।

पिसूरी-परिवार

(FAMILY TRAGULIDAE)

इस छोटे परिवार में केवल एक छोटा जानवर है जो हमारे देश में कहीं-कहीं पाया जाता है। यह घने जंगलों में रहनेवाला प्राणी है जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है।


पिसूरी

(INDIAN MOOSE DEER)

पिसूरी बंद में सब हिरनों से छोटा होता है और इसी से यह जल्द हमारी निगाह सँते नहीं पड़ता। यह हमारे यहाँ मध्यप्रान्त के पूर्वी भाग के जंगलों में तथा दक्षिण भारत के वनों में पाया जाता है, लेकिन अपने छोटे बंद, शरमीले स्वभाव तथा छिपने की आदत से यह हमें बहुत कम दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसके स्वभाव के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं हो सकी है।

पिसूरी की ऊँचाई एक फुट से ज्यादा नहीं होती। लम्बाई में भी यह डेढ़ से दो फुट तक रहता है। इसके शरीर के बाल घने, पतले और मुलायम होते हैं। इसके बदन का ऊपरी हिस्सा भूरा रहता है जिस पर कई कतारों में घनी पीली चित्तियाँ पड़ी रहती

हैं। नीचे का हिस्सा सफेद रहता है और गरदन के बगली हिस्से पर भी नीचे की ओर से तीन सफेद आड़ी पट्टियाँ दोनों ओर चली जाती हैं।



पिसूरी

पिसूरी प्रायः अकेला ही रहता है और कभी खुले मैदानों की ओर नहीं जाता। यह हमेशा जंगलों में पत्थरों और चट्टानों के आस-पास ही रहना पसन्द करता है जिससे ज़तरा निकट आने पर इसे छिपने में देर न लगे। दिन को यह किसी गुफा या चट्टान के नीचे घुसकर आराम करता है। इसका मुख्य भोजन घास-पात है।

पिसूरी बहुत सीधा और डरपोक जानवर है। यह जून, जुलाई में जोड़ा बाँध लेता है लेकिन जाड़े का प्रारंभ होते ही नर-मादा दोनों अलग-अलग रहने लगते हैं। मादा इसी के आस-पास दो बच्चे जनती है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।

उप्टू-समूह

(SECTION TYLOPODA)

एक समूह में वे लम्बी गरदनवाले जीव हैं जो अपने लम्बे अंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें लैंट और अलफका नाम के जीव एकाग्र किये गये हैं जिनके सिर पर सींग नहीं होते। इनके पंखों के बीच में फटे रहते हैं जिनमें गुर की जगह नागून रहते हैं।

एक समूह में एक ही परिवार है जो लैंट-परिवार कहलाता है।

ऊँट-परिवार

(FAMILY CAMILIDAE)

ऊँट अपने परिवार का अकेला प्राणी है जो घोड़े की तरह पालतू कर लिया गया है और अब इसकी जगहों जानि गमार में वहाँ भी नहीं पाया जाती। मनुष्यों के लिए यह बहुत उपयोगी जीव है जिसे रेगिस्तान में गश्त करने के लिए ही प्राणि ने माना ताम तौर पर बनाया है।

ऊँट की एक जाति एशिया में और दूसरी अफ्रीका में पायी जाती है। एशिया के ऊँट की एक किस्म और होनी है जो बैस्ट्रिया के ऊँट कहलाने हैं। इनकी पीठ पर एक के बजाय दो बूँड या मुहाने होते हैं। ये हमारे यहाँ के ऊँटों से, जो वास्तव में अरब के ऊँट हैं, कद में बड़े होते हैं।

ऊँट


(CAMEL)

ऊँट हमारा बहुत ही परिचित पालतू जीव है। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है जो वाष्प में मही ही है। अगर ऊँट हमारे अधीन न होने तो इन बड़े-बड़े रेगिस्तानों में आना-जाना संभव न होता। मनुष्यों के लिए ये गाय-बैल और घोड़े की तरह ही उपयोगी जानवर हैं।

ऊँट को हम सब ने देखा ही है। अतः उसके विनोद परिचय की जरूरत नहीं है। यह लम्बा और ऊँचा जानवर है जो करीब आठ फुट ऊँचा और दस फुट लम्बा होता है। इसी में इसकी लम्बी गरदन भी शामिल है। इसकी टाँग काफी लम्बी होती है जिन पर इसका भारी शरीर टेंगा सा रहता है। इसकी गरदन आगे की ओर काफी बड़ी रहती है और पीठ पर एक कुन्व मा उठा रहता है जिसे कुहाना कहते हैं। इसके बदन का रंग हल्का भूरा रहता है और इसके बाल बहुत मुलायम होते हैं। नर ऊँटों का रंग कुछ गहरा रहता है और वे कद में भी मादा से बड़े होते हैं।

हमारे यहाँ जो ऊँट पाये जाते हैं वे अरब जाति के हैं। इनकी पीठ पर एक ही कुहाना रहता है। बैस्ट्रिया के या दो कुहानेवाले ऊँट यहाँ नहीं पाये जाते। वे मध्य एशिया के निवासी हैं।

घोड़े की तरह ऊँट का ऊपरी ओठ ही उसकी मुख्य स्पर्शेन्द्रिय है, जो दो हिस्सों में बँटी रहती है। इसके कूबड़ की वनावट भी कम आश्चर्यजनक नहीं होती। यह वास्तव में एक चरवी का पिण्ड है जिसमें चरवी जमा रहती है। ऊँट जब रेगिस्तान का लम्बा सफर करता है तो उसको कभी-कभी हफ्तों भोजन नहीं मिलता। उस समय उसके इसी कुहाने में जमी चरवी उसके शरीर का पोषण करती है। इसी लम्बे सफर के बाद ऊँट का कुहाना काफी छोटा हो जाता है। लम्बे सफर में इसके भोजन की समस्या को तो बहुत कुछ इसका कूबड़ सुलझा देता है, लेकिन प्यास के मामले में वह इसकी कुछ भी मदद नहीं करता। ऊँट ने इसीलिए अपने पेट में जल संग्रह करने के लिए करीब आठ सौ छोटी-छोटी थैलियों का विकास कर लिया है जिनमें वह अपने सफर के लिए काफी पानी भर लेता है।



ऊँट

ऊँट की सूँघने की शक्ति बहुत तेज होती है और यह बहुत दूर से सूँघकर ही पानी का पता लगा लेता है। इसकी चाल भी अन्य जीवों से भिन्न होती है। चलते

समय भालू की तरह इसके एक ओर की दोनों टांगें एक साथ ही उठती हैं जिससे इमकी चाल अजीब भी लगती है और इमके सवार का सारा शरीर झकझोर उठता है।

रेगिस्तानवाले प्रदेश के लिए ऊँट बहुत ही उपयोगी जीव है क्योंकि वहाँ के लोग इमसे सवारी का ही काम नहीं लेते बल्कि इमका मांस भी खाते हैं और दूध भी पीते हैं। यही नहीं, इसके चमड़े से जूते आदि बनाये जाते हैं और इसके बाल से कम्बल तथा अन्य ऊनी कपड़े भी तैयार किये जाते हैं।

शूकर-समूह

(SECTION SUINA)

शूकर-समूह में थोड़े ही जानवर हैं। सुअरों के जलावा इसमें अफ्रीका निवासी विशालबाय हिप्पोपोटेमस भी है जिसे दरियाई-धोखा कहा जाता है।

इन जीवों की खाल बहुत मोटी होती है। इनमें कुछ के शरीर पर तो कड़े बाल होते हैं, और कुछ का शरीर सादा ही रहता है।

इस समूह को सुअर-परिवार तथा हिप्पो-परिवार में बाँटा गया है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ केवल सुअर-परिवार के ही जीव पाये जाते हैं इससे यहाँ उसी परिवार का वर्णन दिया जा रहा है।

सुअर-परिवार

(FAMILY SUIDAE)

सुअर-परिवार में सुअर ही अकेला है जैसे कोई इसके साथ रहने को राजी ही न हुआ हो। इन जीवों की खाल बहुत भारी होती है और इनके शरीर के बाल बहुत कड़े होते हैं। इनका धूँध आगे की ओर चपटा रहता है जिसमें भीतर की ओर मुलायम हड्डी का एक चक्कर-सा रहता है जो धूँध को मज्जा बनाये रहता है। इसी गोल और चपटे धूँध के सहारे ये बड़ी आसानी से जमीन तोड़ उलते हैं और बड़े-बड़े पत्थरों को सहज ही में उलट देते हैं।

इनके जबड़े के कुकुरदन्त आगे की ओर बड़े रहते हैं जिससे ये जड़ों को आसानी से काट लेते हैं। इनके आँखों के चक्करों को ऊपर दिखाने के लिए ऊपर की ओर घुंम

जाते हैं लेकिन नीचे के बड़े और सीधे ही रहते हैं। जब ये अपने जबड़ों को बन्द कर लेते हैं तो इनके ऊपर और नीचे के कुकुरदन्त आपस में रगड़ खाते हैं जिसमें उनकी नोक हमेशा तेज बनी रहती है। इनके ये दाँत इतने तेज होते हैं कि उनसे ये बड़ा भयंकर हमला करते हैं और दुश्मनों का पेट तक फाड़ डालते हैं।

इनके पैर चार हिस्सों में बँटे रहते हैं जिनमें के आगे के दोनों हिस्से बड़े और पीछे के छोटे होते हैं। पीछेवाले छोटे खुर उनकी टाँगों में पीछे की ओर लटके रहते हैं और उनसे चलने में इन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती।

इन जीवों की सूँघने की शक्ति बड़ी तेज होती है जिससे ये जमीन के भीतर की स्वादिष्ट जड़ों का पता लगा लेते हैं। जड़ें और फल-फूल को ही इनका मुख्य भोजन मानना चाहिए। वैसे तो ये आलू, गन्ना, शकरकंद, अनाज के अलावा कभी-कभी कीड़े-मकोड़े और गिरगिट वगैरह भी चट कर जाते हैं।

इस परिवार के तीन मुख्य जीवों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

वनैला सुअर

(WILD BOAR)

वनैले या जंगली सुअर को वनैला, बड़ैल और बरहा भी कहते हैं। हमारे यहाँ ये सारे देश में फैले हुए हैं और इनकी काफी बड़ी संख्या हिमालय में भी बारह हजार फुट तक पायी जाती है।

जंगली सुअर शकल-सूरत में हमारे देशी सुअरों जैसे होते हैं, लेकिन इनके नरों के बड़े और नोकीले दाँत रहते हैं। ये लगभग पाँच फुट लम्बे और ढाई-तीन फुट ऊँचे होते हैं लेकिन इनका वजन तीन-चार मन से कम नहीं रहता। इनका मुँह लम्बा, थूथन चपटा और चक्के-सा रहता है। नर मादा से बड़े होते हैं और उनके निचले दाँत पाँच-छः इंच बाहर की ओर निकले रहते हैं। इन्हीं तेज दाँतों से सुअर अपनी आत्मरक्षा के समय बड़ा भयंकर हमला करते हैं और अपने से दूने-चौगुने कद के जानवरों का पेट फाड़ डालते हैं।

जंगली सुअरों का रंग देशी सुअरों की तरह कलछौंह होता है, लेकिन उनमें कभी-कभी सफेद या कलथई रंग की झलक रहती है। इनके ऊपरी हिस्से पर गुद्दी से लेकर

सारी पीठ तब बहुत बड़बाग का एक पन्नि रहता है। बग इनके गारे वस्त्र तिनके दिवरे घात वस्त्र हो रहो हैं। इनके पट्टा का रंग भूरा रहता है ज



वनला सुअर

है। फल तैयार होन पर इनके गराह अवसर सेहें और गन्ने आदि के खना में अप अडडा घना केने हैं जहाँ से निकलकर ये जडावाली फल का बहुत नुकसान करने हैं

इन सुअरानी भा हमारे पाण्डू सुअरो की तरह कीचड में लोटना बहुत पस है। इनका मुख्य भोजन घास पात और जड़ें हैं। कदमूल के अलावा कभी-कभी ये मरे हुए जानवरो का मांस भी खा लेते हैं। दिन में तो ये घाड़िया में घुसे रहते हैं। दिन के आठ-दस का गरोह चराई के लिए निबल पडना और रात भर चरकर सुबह फिर अपन स्थान पर लौट आता है।

जगली सुअर बहन तेज भागते हैं लेकिन यह तेजी थोड़ी ही दूर तक रहती है। ये जैसे तो शान्त जीव हैं और आहत पान पर अकारण हमला न करके भागना ही पसन्द करते हैं लेकिन घायल हो जान पर ये जान पर खलकर ऐसा भयकर हमला करते हैं कि उसने आम गार क भी छक्के छू जाने हैं। सर ही क्यों घायल होन पर ये हाथी पर भी हमला करन में नही चूकने।

इनकी मादा साठ म दो बार बच्चे देती है जो मस्या में चार म छ तक होते हैं। इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।


हाने पर सिल्लो मांस खाता है। बच्चे हलके रंग के होते हैं जिनका रंग पर गडावाली गाडा पनरिया पडा रहती है

जगली सुअर ज के अलावा घास के मूले बछारो और शाक्यों भरे हुए नांग और जी नीबी जगहो में भी र

सानो वनैल (PIGMY HOG)

सानो वनैल का निवास-स्थान नेपाल है। वहाँ यह तराई के जंगलों में काफी संख्या में पाया जाता है। इसके अलावा देश में यह और कहीं नहीं पाया जाता।

सानो वनैल कलछौंह भूरे रंग का सुअर है, जो कद में दो सवा दो फुट लम्बा और करीब एक फुट ऊँचा रहता है। इसका वजन आठ-नौ सेर से ज्यादा नहीं होता। वच्चों का रंग गाढ़ा भूरा रहता है, जिन पर खड़ी-खड़ी कत्थई पटरियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी गरदन और पीठ पर कुछ दूर तक कड़े वाल होते हैं, जो सारी पीठ पर नहीं फैले रहते। इसके वदन पर के बाल भी कड़े होते हैं। यह शाकाहारी और बहुत सीधे स्वभाव का सुअर है जो ऊँची घास के बीच गरोह बाँधकर रहता है। इसके गरोह में पाँच से बीस तक सुअर रहते हैं। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।



सानो वनैल

सानो वनैल प्रायः रात में ही बाहर निकलता है। इसी से हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जान सके हैं। यह कद में भी छोटा होता है जिससे इसे छिपने में बहुत आसानी होती है। इसकी अन्य आदतें जंगली सुअरों से मिलती-जुलती हैं। नेपाली भाषा में सानों का अर्थ छोटा होता है। इसे इसी से सानो वनैल कहा जाता है।

सुअर

(PIG)

पालतू सुअर गनार के प्रायः सभी भागों में फँड़े हुए हैं। इनकी अनेक जातियाँ बन गयी हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करती मफेंद्र या चितवर्दगी हो गयी हैं, लेकिन हमारे देश में पालतू सुअरों की एक ही जाति पायी जाती है जो सनस-सूत में ही नहीं रंग-रंग में भी जगदी सुअरों में मिलती जुलती हैं।



सुअर

हमारे यहाँ सुअर पालने का रिवाज बहुत कम है क्योंकि मुसलमान तो इन्हें छूने ही नहीं और हिन्दू लोग भी इन्हें बहुत कम मानते हैं। यहाँ इनका पालन केवल परिगणित जातियों तक सीमित है। इसी कारण इनकी नस्ल में उन्नति नहीं हो रही है। यहाँ के पालतू सुअर विदेशी सुअरों की तरह न तो मफेंद्र ही हात हैं और न उनके बदन पर बाहरी सुअरों की तरह चर्बी ही लदी रहती है। ये जगदी सुअरों की तरह बलछोह ही होते हैं लेकिन बर्नला की तरह इनका तल और बड़ दात नहीं होते।

पालतू सुअर बर्नलों की तरह बहुत हठी और बेवकूफ होते हैं लेकिन उनकी तरह इनमें फुर्ती नहीं होती। इनका मुख्य भोजन शाक पान और कन्दमूल है लेकिन इनमें विच्छा खाने की ऐसी गरी आदत है कि ये बनी घृणा की दृष्टि में देखे जाते हैं।

इनकी मादा साल में दो बार बच्चे देती है, जिनकी संख्या चार से दस तक रहती है। इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है।

अश्व उपवर्ग

(SUB-ORDER PERISSODACTYLA)

इस छोटे उपवर्ग में थोड़े ही जीव हैं जो अपने खुर या सुम की बनावट में भेद होने के कारण अन्य खुरदार जीवों से अलग कर दिये गये हैं ।

इस वर्ग को तीन परिवारों में इस प्रकार बाँटा गया है—

१. अश्व-परिवार—Family Equidae
२. टेपर-परिवार—Family Tapiridae
३. गैंडा-परिवार—Family Rhinocerotidae

हमारे देश में टेपर नहीं पाये जाते अतः यहाँ केवल अश्व-परिवार और गैंडा-परिवार का वर्णन दिया जा रहा है ।

घोड़ा-परिवार

(FAMILY EQUIDAE)

घोड़ा-परिवार में घोड़े, गोरखर और गदहे के अलावा दूसरे देशों में पाये जाने-वाले क्वागा और जेवरा आदि भी शामिल किये गये हैं जिनके खुर बीच में फटे हुए नहीं होते । ये सब एक-शफ प्राणी कहे जाते हैं ।

इस परिवार में हमारे यहाँ का एक और प्रसिद्ध जीव आता है जिसे खच्चर कहते हैं । खच्चर, गदहे और घोड़ी के संयोग से पैदा होता है और अपनी मजबूती के लिए संसार में प्रसिद्ध है । यह जहाँ घोड़े की तरह लम्बा और बलवान होता है वहीं गदहे की तरह बोझ ढोने में भी बेजोड़ होता है लेकिन इनमें संतान-वृद्धि की शक्ति नहीं होती । खच्चर और खच्चरी से बच्चे नहीं पैदा होते । नये खच्चर तो गदहे और घोड़ी के संयोग से ही पैदा हो सकते हैं ।

ये सब जीव शाकाहारी हैं जिनके ओठ इनके लिए बहुत उपयोगी हैं । ये उनकी स्पर्शेन्द्रियों में से एक हैं जिनसे ये घास-फूस को पकड़कर अपने मुँह के भीतर खींच लेते हैं, जहाँ इनके तेज दाँत उन्हें बड़ी सफाई से कुतर लेते हैं ।

इस परिवार के प्राणी अपनी तेज चाल और गठीले वदन के लिए प्रसिद्ध हैं । ये हाथी की तरह बुद्धिमान और कुत्ते की तरह स्वामिभक्त होते हैं । गदहा भी, जो


आम तौर पर बेंबुरूप बना जाता है, कम अंकुश नहीं होता। इन सबमें गज्य की स्मरण-शक्ति होती है।

यहाँ आने यहाँ पाये जानेवाले घोड़े, गदहे और गोरख का वर्णन दिया जा रहा है।

घोड़ा

(HORSE)

घोड़े ने भला ऐसा बीन है जो परिचित न होगा ? मनुष्यों का यह शायद सबसे पुराना साथी है। यही नहीं, मानव सभ्यता में इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है और आज इस मशीन-युग में भी उसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है।



घोड़ा

घैल की तरह घोड़ा भी बहुत सुन्दर और सुढील जानवर है जिसके शरीर में गठन को कोई जानवर नहीं पा सकता। इसका एक एक् अंग जैसे सॉच में ढाला हुआ जान पड़ता है। इसे मनुष्यों ने जब से पालतू किया, इसका तो कुछ ठीक-ठीक पता नहीं चलता, लेकिन जब से इतिहास मिलता है तब से घोड़े को हम मनुष्य के आजा-कारी सेवक की तरह उसके साथ मौजूद पाते हैं।

घोड़े के विकास की कहानी बड़ी रोचक है। इन्हें अपने पूर्वजों से इस वर्तमान मोडे की शकल में आने में लगभग चार करोड़ वर्ष लग गये। इनके पूर्वज इयोहिप्पस (Eohippus) कद में लोमड़ी के बराबर होते थे और उनके पैरों में चार चार उँगलियाँ

रहती थीं। उसके बाद वे अपना विकास करके मिसोहिप्पस (Mesohippus) बने जब उनका कद भेड़ के बराबर हो गया। इस समय वे तीन उँगलियों के बल चलने लगे क्योंकि उनकी चौथी उँगली का लोप हो गया था। कुछ समय बीतने पर उनका फिर विकास हुआ और वे मेरिकहिप्पस (Merychippus) के रूप में परिवर्तित हुए। इस समय उनका कद गदहे के बराबर हो गया था और उनके पैरों के बीच की उँगली आगे बढ़कर सुम की शकल की हो गयी और वे एक ही उँगली पर चलने-फिरने लगे। कुछ काल बाद फिर परिवर्तन हुआ और बगल की दोनों बेकार उँगलियाँ गायब हो गयीं। अब उनके पैर में केवल एक सुम या टाप रह गया। उनका कद बढ़ गया और वे ही घोड़े के रूप में हमारे सामने हैं। अपने सुम के विकास में इस प्रकार इन्हें एक दो नहीं करोड़ों, वर्ष तक घोर संघर्ष करना पड़ा।

घोड़ों की वैसे तो अनेक नस्लें संसार में हैं लेकिन अरब का घोड़ा सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। हमारे देश में काठियावाड़ के टाँधन प्रसिद्ध हैं जो कद में छोटे और मजबूत होते हैं।

घोड़ा शाकाहारी जीव है, जो दाना-घास वगैरह बड़े स्वाद से खाता है। इसके ओठों में गजब का स्पर्शज्ञान रहता है। हमारे यहाँ इनकी कोई विशेष जाति नहीं है, लेकिन जो घोड़े हैं उन्हें उनके रंगों के नाम से पुकारा जाता है जैसे मुश्की, सब्जी, कुम्भैद, सुरंग, नुकरा, समंद आदि।

घोड़ी ग्यारह महीने पर एक बच्चा जनती है।

गदहा

□

(ASS)

गदहा भी घोड़े की तरह हमारा बहुत परिचित पालतू जीव है जो घोड़े का भाई-बन्धु होकर भी हमारे देश में न जाने क्यों इतनी अनादरकी दृष्टि से देखा जाता है। इसके बारे में लोगों का ख्याल है कि यह बहुत वेवकूफ जानवर है और इसी कारण किसी को वेवकूफ कहने के लिए हम इसके नाम का उपयोग करते हैं, पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं। गदहा अपनी जाति के पशुओं में करीब-करीब सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। यह सीधा, परिश्रमी और सहनशील तो होता ही है, बोझ उठाने में भी अपना सानी नहीं रखता। इसके और घोड़ी के मेल से पैदा हुआ खच्चर तो बोझ

उठाने में हमने भी आगे रहना है। बड़ी-बड़ी फीजी तोंपों को खींचना मक्खर का ही काम है।

हमारे देश में ज्यादातर धोत्री ही इस निरीह जीव को पालने हैं लेकिन फारस, अरब और मिस्र आदि देशों में गदहे का बड़ा आदर है। वहाँ इस उपयोगी पशु का आदर करना लोग जानते हैं। इसी से वहाँ इसकी कई अच्छी नस्लें तैयार कर ली गयी हैं और हमारे यहाँ के छोटे बंद के गदहे से वहाँ के गदहे बड़े और मजबूत हो गये हैं।



गदहा

हमारे यहाँ का गदहा करीब तीन फुट ऊँचा और चार, साढ़े चार फुट लम्बा होता है। इसकी शकल-मूरत घोड़े जैसी रहती है और इसके पैरों में भी उसी की तरह मुँग रहता है। इसके कान काफी लम्बे होते हैं जो आगे की ओर झुके रहते हैं। इसके बदन का ऊपरी रंग सिलेटी रहता है जो ऊपर गाढ़ा और बगल में हलका हो जाता है। नीचे का हिस्सा और यूथन सफेद रहता है। इसके गले पर एक काली धारी पड़ी रहती है जैसे इसे किसी ने काले रंग का हार पहना दिया हो। यह बड़ी भद्दी बोली बालता है जो सीपी सीपी-सी लगती है। इसकी समूची दुम घोड़े की तरह बालों से ढकी न रह कर कुछ दूर तक नगी ही रहती है जिसके सिरे पर बालों का एक गुच्छा रहता है।


इसका मुख्य भोजन घास-पात है। इसकी अन्य आदतें घोड़े से मिलती जुलती होती हैं। इससे उन्हे फिर से दुहराना ठीक नहीं।

गदही लगभग ग्यारह महीने पर एक बच्चा जनती है।

गोरखर

(WILD ASS)

गोरखर जंगली गधहा है। यह वैसे तो मध्य एशिया का निवासी है लेकिन हमारे देश में इसकी थोड़ी-बहुत संख्या बीकानेर, गुजरात और जैसलमेर के आस-पास पायी जाती है। यह जंगली गधहा गोरखर कहलाता है और इसका कद हमारे गधहों से कुछ ऊँचा होता है। मादा नरों से कुछ छोटी होती है।



गोरखर

गोरखर का रंग गधहों की तरह सिलेटी न होकर पिलछाँह राखी रहता है जिसमें थोड़ी ललाई भी रहती है। हलका थूथन, पेट और टाँगों का भीतरी हिस्सा सफेद रहता है और अयाल की जड़ से दुम की जड़ तक एक गहरे खैरे रंग की पट्टी चली जाती है जो कंधे के पास कभी एक और कभी दो जगह, इसी रंग की धारी से कट जाती है। इसके पैर पर भी कभी-कभी इसी तरह की धारियाँ रहती हैं। इनके अयाल और दुम के बाल गाढ़े कथई या काले रहते हैं और खुरों या सुमों के ऊपर एक गाढ़े रंग की धारी पड़ी रहती है। कान गधहों की तरह लम्बे और आगे की ओर झुके रहते हैं।

गोरखर झुंड में रहनेवाले प्राणी हैं जो ज्यादातर रेगिस्तानों या खुले हुए ऊसरी मैदानों में फिरा करते हैं। इनका गरौह चार-पाँच से लेकर बीस-पच्चीस तक का होता है, लेकिन कभी-कभी इनके इससे भी बड़े गरौह दिखाई पड़ते हैं। इनका एक और

निकट सम्बन्धी जानवर क्वागा (Quaga) है जो शबल-मूरत में गोरखर ही जैसा होता है। उसकी मरदन पर जेबरे की तरह धारियाँ पड़ी रहती हैं लेकिन ये हमारे देश में नहीं पाये जाते।

गोरखर का मुख्य भोजन घास पात है। ये भी गदहा की तरह रेंकते हैं जिन इनकी आवाज गदहा से भी तेज और पक्का होती है। ये बड़े ता बहुत शरमिले जानवर हैं लेकिन भागने में इनने तेज हाते हैं कि इनका पकड़ना आसान नहीं होता। पकड़े जान पर आधे से ज्यादा गोरखर मर जाते हैं और जो बचने भी हैं उनको पालू करना बहुत कठिन होता है।

बलूचिस्तान की ओर लाग इनका मास भी खाने हैं जो काफी स्वादिष्ट होता है। इनकी मादा घोड़ी की तरह ग्यारह महीने पर एक बच्चा देती है जिसका समय जून से अगस्त तक रहता है।

गैडा-परिवार

(FAMILY RHINOCLROTIDAL)

गैडा परिवार में गैडा ही अकेला एक प्राणी है जो अपने यहाँ का बहुत प्रसिद्ध जीव है। इसकी वैसे तो तीन जातियाँ हैं लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही जाति का गैडा पाये जाते हैं। बाकी दो जातियाँ अफ्रीका व जंगलों में मिलती हैं।

गैडे का शरीर बहुत भारी और गठीला होता है। उसकी नाक के ऊपर एक छाल या सींग रहता है जो इसका अस्त्र है। यह खाने वास्तव में उसकी नाक के ऊपर का छाल है जो आपस में बिपककर इतने बड़े हो गये हैं कि उसने आगे हड्डी कोई चीज नहीं। यह दूरी में शेर और हाथी का पेट चीर डालता है।

इसके बदन की माटी गाल इसका बदन में लटकती सी रहती है जिसमें स्थान स्थान पर सिकुड़न पड़ी रहती है। कुछ विदेशी गैडो व एक ही जगह आगे-पीछे दो सींग रहते हैं। यहाँ तो केवल अपने यहाँ का गैडे का हाल दिया जा रहा है।


गैडा

(RHINOCLROTUS)

गैडे हमारे देश का प्रसिद्ध जानवर है। हमारे यहाँ ये अब बहुत कम संख्या में रह गये हैं और इन्हें आसाम के जंगल और नेपाल की तराई के सिवा दस व अग

किमी भाग में नहीं देखा जा सकता। हम इन्हें अपने चिड़ियाघरों में अवश्य देख सकते हैं लेकिन सब चिड़ियाघरों में इनको पालना आसान काम नहीं।

गैंडे का कद लगभग साढ़े दस फुट लम्बा और पाँच-छः फुट ऊँचा होता है। इसके थूथन पर करीब एक फुट लम्बा सींगनुमा खाग रहता है जो बहुत तेज होता है। यह खाग वास्तव में इसका सींग नहीं है बल्कि यह तो उसके कड़े वालों के आपस में चिपक जाने से सींगनुमा बन जाता है और बहुत कड़ा हो जाता है। ये खाग नर और मादा दोनों के होते हैं और एक बार टूट जाने पर उसके स्थान पर दूसरा खाग निकल आता है।



गैंडा

गैंडे के शरीर का रंग कलछाँह सिलेटी रहता है और इसकी मोटी खाल पर कान और दुम को छोड़कर कहीं भी बड़े बाल नहीं होते। इसकी खाल बहुत मोटी होती है जिसमें जगह-जगह शिकन-सी पड़ी रहती है। इसी से इसका वदन ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी ने इसके सारे शरीर को ढालों से ढक दिया हो। इसके पैरों में तीन-तीन नाखून रहते हैं जो हाथी के नाखून से मिलते-जुलते होते हैं। इसके पैर छोटे और गठीले होते हैं और इसका सिर बड़ा और आँखें छोटी होती हैं।

गैंडे को ऊँचे पहाड़ ज्यादा पसन्द नहीं हैं। इसीलिए यह तराइयों में ऊँची घास के बीच अकेला घूमा करता है। लेकिन कभी-कभी एक ही जगह कई गैंडे दिखाई पड़ जाते हैं। इसका मुख्य भोजन घास-पात है जिसके लिए यह सुबह-शाम इधर-उधर

चक्कर लगाता रहता है। दिन में यह पड़ा साता रहता है और प्रायः रोज एक ही जगह बिप्टा करता है।

गैंडा जैसे तो बड़ा शान्त और सीधा जानवर है, लेकिन घायल हा जाने पर यह बड़ा भयंकर हमला करता है। उस समय यदि हाथी भी इसके सामने पड़ जाय तो यह उसकी परबाह नहीं करता और अपने निचले दाँता से सुअर की तरह बड़ी करारी चोट करता है। यह बैसे तो शरीर से भारी भयंकर होता है, लेकिन थोड़ी दूर तक बड़ी तेजी से सरपट भाग लेता है।

गैंडे की उम्र काफी होती है। यह सौ वर्ष तक जीते देखा गया है। इसकी मादा सतह-अटारह महीने पर एक बच्चा जनती है। इसका मांस स्वादिष्ट होता है।

गज उपवर्ग

(SUB ORDER PROBOSCIDAE)

गज उपवर्ग में केवल हाथी ही अकेला प्राणी है जो अपनी लम्बी सूँड के कारण अन्य स्तनपायी जीवों से अलग कर दिया गया है।

इस उपवर्ग में केवल एक ही परिवार है जो गज-परिवार कहलाता है। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है।

गज-परिवार

(FAMILY ELEPHANTIDAE)

इस परिवार में हाथी ही अकेला प्राणी है जिसकी दो जातियाँ हैं—एक भारतीय हाथी और दूसरा अफ्रीकन हाथी। हमारे देश में केवल भारतीय हाथी पाये जाते हैं। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है।

इन जीवों की विशेषता इनकी लम्बी सूँड और इनके लम्बे कृन्तक दाँत हैं जो बारी बढकर उनके मुख से कई फुट आगे निकले रहते हैं। सूँड ही हाथी का हाथ है और वही उसकी स्पर्श और घ्राण इन्द्रिय भी। इसी सूँड के सहारे वह पेड़ की डालों को तोड़ता है और खाने के लिए उसकी छाल को बड़ी सफाई से उघेड़ लेता है।

ये जानवर जंगल में रहनेवाले यूँचारी जीव हैं जिन्हें मनुष्य पकड़कर पालू कर लेते हैं। स्थल पर रहनेवाले स्तनपायी जीवों में यह सबसे भारी भयंकर होता

है, फिर भी इसमें आलस जैसे छू नहीं गया है। दौड़ने में असमर्थ होने पर भी यह सों, दो सों गज तक इतनी तेजी से अपटता है कि तेज भागनेवाला आदमी तेजी से भागकर भी इससे वच नहीं सकता।


इसकी दूसरी जाति, जो अफ्रीका में पायी जाती है, शकल-मूरत में इससे कुछ भिन्न होती है। उस जाति के हाथियों के कान तो बड़े होते ही हैं, कद में भी वे भारतीय हाथियों से बड़े होते हैं। उनके नर-मादा दोनों के बड़े-बड़े दाँत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल नर हाथी दाँत ले होते हैं।

हाथी

(ELEPHANT)

हाथी हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और शानदार जानवर है जिसे हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने न देखा हो।

हाथी उन पालतू जानवरों में से हैं जिनकी जंगली जाति अब भी जंगलों में मौजूद है और जो वहाँ से आवश्यकतानुसार पकड़कर पालतू बना लिये जाते हैं। ये घोड़े, ऊँट और गाय-बैल की तरह सबके सब ऐसे पालतू नहीं कर लिये गये हैं कि उनकी जंगली जाति का लोप हो जाय।



हाथी

हमारे देश में हाथी ज्यादातर तो हिमालय की तराई के घने जंगलों में पाये जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी कुछ संख्या मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत के घने जंगलों में भी फैली हुई है। ये पहाड़ पर अधिक ऊँचाई पर नहीं जाते और अपना ज्यादा समय तराई के घने जंगलों में ही बिताते हैं।

हाथी लगभग आठ-दस फुट ऊँचे होते हैं, लेकिन हथिनियाँ करीब आठ फुट की

ही होनी है। हाथी के दुम के सिरे से मूँड के सिरे की लम्बाई उसकी ऊँचाई में तिगुनी के करीब रहती है। उनका वजन लगभग अस्सी मन होता है।

हाथी के शरीर का रंग कलछोह सिलेटी रहता है, लेकिन उसके माथे पर, कान पर और गर्दन में ऊपरी हिस्से पर कभी-कभी प्याजी, भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। हाथी के बदन पर बाल नहीं होने, सिर्फ दुम के सिरे पर बहुत कड़े बालों की दो कतारें रहती हैं। नर हाथी के दो बड़े-बड़े दात आगे की ओर निकले रहते हैं, लेकिन मादा के ये दात बहुत छोटे ही रह जाते हैं। नर के दाँतों की लम्बाई जैसे तो अलग-अलग रहती है, लेकिन बड़ा से बड़ा दात आठ फुट तक लम्बा मिला है। इनके जगले पैरों में अक्सर पाँच चौड़े नाखून होते हैं। लेकिन पैरों में इनकी संख्या चार ही रहती है। उसकी आँखें छोटी और कान बड़े पखे जैसे होते हैं जिसे ये मक्खियाँ उड़ाने के लिए बराबर हिलाते रहते हैं।

हाथी झुंड में रहनेवाले जीव हैं जो बड़े-बड़े गरोह बनाकर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात, पत्तों की छाल तथा बांस के नरम कल्ले हैं जिनकी तलाश में ये जंगलों में इधर-उधर छिटक जाते हैं और चराई के बाद फिर इकट्ठा होकर अपना बड़ा गरोह कायम कर लेते हैं। इस गरोह की मरदारी किसी दंतकै हाथी को न मिलकर मदा किसी हथिनी को ही मिलती है जो सबका निषेध करती है।

हाथी की मूँड उसका सबसे उपयोगी अंग है जिसको हम उसका हाथ कह सकते हैं। इसी मूँड में वह पेड़ की छाल उधेड़कर खाता है और इसी में पानी भरकर अपने मुँह में उड़ेल लेता है। यही नहीं, छोटी-छोटी चीजों को भी वह अपनी इसी मूँड से उठा लेता है।

हाथियों को पानी बहुत पसन्द है। इसीमें गर्मियों में वे घटो पानी में पड़े रहते हैं। तेज धूप में जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे अपनी मूँड को मुँह में डालकर उसमें धूब भर लेते हैं और उगी को अपने बदन पर छिड़कते हैं। वे तैरने में बहुत ही उस्ताद होते हैं और गुड़की पर रहनेवाला नोई भी जानकर तैरने में उनका मुँहावा नहीं कर सकता।

हाथी जैसे तो डरप्राय और मीथे जानवर हैं, लेकिन कुछ नर और बच्चावाली मादाएँ अक्सर दूगरी पर हमला कर बैठती हैं। उस समय ये अपनी मूँड को स्प्रेड लेती हैं और अपने पैरों तथा दाँतों से बड़ा भयंकर हमला करती हैं। यदि किसी तरह दुमन

उनकी लपेट में आ गया तो वे उसे पैरों से रौंदकर उसकी जान ले लेती हैं। आज्ञापालन में तो हाथियों से आगे शायद ही कोई जानवर बढ़ पाया हो। एक छोटे अंकुश के सहारे इतने बड़े जानवर की गरदन पर बैठकर महावत किस तरह उसे जिधर चाहता है ले जाता है, यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है।

हाथी की उम्र लगभग सौ वर्ष तक की मानी जाती है। जंगल में रहनेवाले हाथी तो और ज्यादा दिनों तक जीते हैं। पचीस वर्ष में तो ये जवान ही होते हैं।

हथिनियाँ अठारह से बीस महीने पर एक बच्चा जनती हैं लेकिन कभी-कभी वे दो बच्चे भी देती हैं। ये बच्चे ज्यादातर सितम्बर से नवम्बर के बीच में होते हैं जो पैदा होने के समय तीन फुट ऊँचे रहते हैं।

तीक्ष्णदन्त वर्ग

(ORDER RODENTIA)

इस वर्ग में वे सब छोटे कद के जीव एकत्र किये गये हैं जिनके दाँतों को, प्रकृति ने बहुत तेज़ और कड़ी चीजों तक को कुतर डालने के योग्य बनाया है। इनमें के अधिकांश जीव पृथ्वी पर रहनेवाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पेड़ों पर अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पानी में ही रहना पसन्द किया है।

इनके बारे में और कुछ जानने से पहले इनके दाँतों के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है क्योंकि इनकी इसी विशेषता के कारण इनका अलग वर्ग बनाया गया है। इनके जबड़ों में चारों तरह के दाँत न होकर केवल दो ही तरह के होते हैं, कृन्तक दन्त और दाढ़ें। कृन्तक लम्बे और काफी भजवूत होते हैं और उनके बाहरी हिस्से पर भजवूत पालिश चढ़ी रहती है जैसी तामचीनी के बर्तनों पर होती है। इस पालिश या चिकनी तह के कारण इनके दाँत सामने की ओर से तो घिसने नहीं पाते लेकिन ऊपर और नीचे के दाँतों की रगड़ से उनका भीतरी हिस्सा घिस जाता है। ऐसा होने से उनके दाँत सदैव तेज़ और पैसे बने रहते हैं। ये दाँत निरन्तर बढ़ते रहते हैं जिससे रगड़ खाने से दाँत का जितना हिस्सा घिसता है उतना फिर बढ़ जाता है। बस दिक्कत तभी पड़ती है जब उनका कोई दाँत टूट जाता है क्योंकि तब दूसरे जबड़े के सामनेवाला दाँत बढ़ता चला जाता है जो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक

बढ़ जाता है कि दूसरे जवड़े में छेद कर देता है और कभी-कभी इसमें इन जानवरों की मौत तक हो जाती है।

इस वर्ग के प्राणी सारे ससार में फँटे हुए हैं जो दौड़ने, तैरने, छलांगें मारने के अलावा पेड़ों पर चढ़ने में भी उस्ताद होते हैं। इनमें के अधिकांश के शरीर पर बाल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके शरीर पर के बाल काँटा में बदल गये हैं। इनमें प्रायः सबके पैरों में पाँच-पाँच उँगलियाँ रहती हैं जिनमें तेज नाखून होते हैं। इन जानवरों का मुख्य भोजन बड़े तो वृक्षों की छाल और जड़ें आदि हैं, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिन्हें सर्वभक्षी कहा जा सकता है। इनकी मादाएँ साल में कई बार बच्चे देती हैं।

यह वर्ग दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है —

१ एक दन्त उपवर्ग—Sub Order Simplicidentata

२ द्वि दन्त उपवर्ग—Sub Order Duplicidentata

एकदन्त उपवर्ग में साही गिलहरियाँ और चूहे हैं तो द्विदन्त उपवर्ग में सब प्रकार के छरगोश रखे गये हैं। आगे दोनों उपवर्गों का अलग-अलग वर्णन दिया जा रहा है।

एकदन्त उपवर्ग

(SUB ORDER SIMPLICIDENTATA)

एकदन्त उपवर्ग के प्राणियों के मुख के ऊपरी जवड़े में आगे की ओर दाँतों की एक ही जोड़ी रहती है। इसी एक विशेषता के कारण इन्हें एक अलग उपवर्ग में रखा गया है—

इस उपवर्ग को विद्वानों ने इस प्रकार फिर तीन समूहों में विभक्त किया है—

१ गिलहरी-समूह—Section Scuriomorpha

२ चूहा-समूह—Section Myomorpha

३ साही-समूह—Section Hystricomorpha

इन तीनों समूहों में सब प्रकार की गिलहरियाँ, चूहे और साहियाँ आ जाती हैं।

गिलहरी-समूह

(SECTION SCIUROMORPHA)

गिलहरी-समूह वैसे तो चार परिवारों में विभक्त है, लेकिन हमारे यहाँ जिन दो परिवारों के जीव पाये जाते हैं वे इस प्रकार हैं—

१. गिलहरी-परिवार—Family Sciuridae

२. सूरज भगत-परिवार—Family Petauristidae

पहले परिवार में हमारी परिचित गिलहरियाँ और दूसरे परिवार में उड़नेवाली गिलहरियाँ रखी गयी हैं।

गिलहरी-परिवार

(FAMILY SCIURIDAE)

गिलहरी-परिवार के जीवों से हम सब परिचित ही हैं। ये जीव अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। वैसे भोजन की तलाश में हम इन्हें जमीन पर भी दौड़-धूप करते देख सकते हैं।

ये जीव बड़े फुरतीले और सफाई-पसन्द होते हैं और विल्लियों की तरह अपना बदन चाटकर साफ करते रहते हैं। इनकी दुम लम्बी और झबरी रहती है और इनके शरीर पर के बाल भी घने, कोमल और चमकीले होते हैं।

ये अपने बच्चों के लिए सुन्दर और मुलायम घोंसला बनाते हैं और अपनी खुराक को पहले से इकट्ठा करते रहते हैं। इनका मुख्य भोजन फल-फूल, अन्न और जड़ है। यहाँ अपने यहाँ की तीन प्रसिद्ध गिलहरियों का वर्णन दिया जा रहा है।

जंगली गिलहरी

(LARGE INDIAN SQUIRREL)

गिलहरियों से हम सभी परिचित हैं। इनमें कुछ तो हमारे बाग-वगीचों में रहती हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो अपना सारा समय जंगलों में ही बिताती हैं।

हमारे यहाँ की बड़ी जंगली गिलहरी को कराट या रासू कहते हैं। यह हमारे बाग-वगीचों में पायी जानेवाली छोटी धारीदार गिलहरी से शकल-सूरत में ही नहीं,

रग और कद में भी भिन्न होती है। यह अपना सारा समय घने जंगलों में बिताती है इसलिए इसका जगना गिलहरी कहा जाता है।

कराट हमारे देश में मध्य भाग के सारे घने जंगलों में पायी जाती है। पूरब



जंगली गिलहरी

दाल में दूरी डाल पर बीस मीटर तक कूद जाती है।

कराट का मध्य भाग पर पर बीज नरम और कलियाँ हैं। इसका जगना पर की मीठा और बिस्मिया के अण्ड भी बड़े मध्य में गायी है।

कराट जंगल में हिमा ऊँची पर टहनियाँ और पत्तियों का घानना बनाती है जिसमें समय आने पर माना नीचे चार बच्चे जनता है।

की ओर भी यह जंगली जाना में पायी जाती है। इस गिलहरी का बच्चा जगना पर पुत्र लम्बा होता है और इसके इनती ही बच्चे दुम भी रहती है। इसका ऊपरी हिस्सा गाय के बच्चे या बच्चे का गाय लाल रहता है। इसके बाल के सामने में माथ के ऊपर तक एक हल्के रंग की पट्टा रहती है और एक बच्चे घायी पर दन के पाम में बगल तक पगी रहती है। नीचे का हिस्सा हल्का बागमा या बिस्मिया भूरा रहता है।

कराट जगना में रहने वाली गिलहरी है जो अपना माग समय ऊँचे पेड़ पर बिताती है। यह जमीन पर बहुत कम जनता है और एक

रुकिया

(BROWN SQUIRREL)

रुकिया भी जंगली गिलहरी है जो हमारे देश के दक्षिणी भाग के जंगलों में पायी जाती है। इसका शरीर एक फुट से कुछ बड़ा होता है, और इसके लगभग उतनी ही बड़ी झवरी हुम रहती है।



रुकिया

इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा कलछौंह सिलेटी होता है और दोनों बगलों के हिस्से तथा गुद्दी का कुछ हिस्सा वादामी रहता है। नीचे का रंग हलका वादामी या गंदा सफेद रहता है।

रुकिया की और सब आदतें कराट से मिलती-जुलती होती हैं और यह भी उसी की तरह अपना ज्यादा समय पेड़ों पर ही बिताती है। यह भी पेड़ों पर किसी खोथे में अपना घोंसला बनाती है और इसका भी मुख्य भोजन फल-फूल, बीज, नरम कल्ले, कीड़े-मकोड़े और अण्डे आदि हैं।

इसकी मादा तीन-चार बच्चे जनती है।

गिलहरी

(PALM SQUIRREL)

अपनी धारीदार गिलहरीया मे हम सभी परिचित हैं। ये हमारे बाग-बगीचा व अनावा उादे आम-नाम के मकानों में भी घुस की तरह फिरा करती हैं।

इस गिलहरी का वहीं-वही गिल्ली या चिचुरा भी कहते हैं। दहाना में यह गुरगरी व नाम से प्रसिद्ध है। हमारे देश में यह प्रायः सभी स्थानों में पायी जाती है।



गिलहरी

गिलहरी बहुत ही चंचल हाती है जो दिन भर पहा की एक डाल से दूसरी डाल पर या जमान पर इतर उधर फिरा करती है। पेना की एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में यह इतनी उस्ताद होती है कि इस शायद ही कभी किसी ने गिरने देखा होगा।

यह गिलहरी बड़ में छ इंच के लगभग हाती है और इसके इतनी ही लम्बी डुम भी रहती है। इसकी पीठ का रंग भूरा कालाँह या सिन्टी मायल भूरा रहता है जिस पर तीन सफेद रंगी धारियाँ पनी रहती हैं। बीच की सफेद धारी बढ़कर डुम की जड़ तक पहुँच जाती है। नीचे का रंग सफेद रहता है। इसने बाल बहुत मुलायम होने हैं।

गिलहरी का मुख्य भोजन फल-फूल, गल्ला और बीज हैं, लेकिन यह कीड़े-मकोड़े और अण्डे भी खूब मजे में खाती है। अन्य गिलहरियों की तरह यह भी घोंसला बनाती है। इसका घोंसला घास-फूस, ऊन और गूदड़ आदि का बना होता है जो काफी बड़ा और सुन्दर होता है। यह किसी पेड़ के खोथे में रखा रहता है।

शिगशाम

(BLACK HILL SQUIRREL)

शिगशाम भी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध जंगली गिलहरी है जिसे काली जंगली गिलहरी कहते हैं। यह हमारे देश में हिमालय के पूर्वी भागों में, नेपाल के आस-पास और उसके पूर्वी हिस्सों में पायी जाती है। वहाँ यह शिगशाम के नाम से प्रसिद्ध है।



शिगशाम

शिगशाम कराट से कुछ छोटी जरूर होती है लेकिन इसकी दुम कराट की दुम से लम्बी रहती है। इसके शरीर का ऊपरी भाग काला या क्यई और चेहरे और दुम का रंग गंदा पिलछींह रहता है। इन गिलहरियों के रंग में बहुत भेद रहता है और अलग-अलग स्थान की शिगशाम भिन्न-भिन्न रंग की होती हैं, लेकिन अपनी लम्बी दुम के कारण ये अन्य गिलहरियों से छिप नहीं पातीं।

शिगशाम प्रायः जोड़े में रहती हैं। इनकी बोली बहुत तेज और कर्कश होती है। इनका मुख्य भोजन वैसे तो आक-पात है, लेकिन ये कीड़े-मकोड़े और अण्डे भी बड़े स्वाद से खाती हैं।

इनकी और आदतें दूसरी गिलहरियों की ही तरह होती हैं।

सूरजभगत-परिवार

(FAMILY PETAURISTIDAE)

यह परिवार छोटा ही है जिसमें उड़नेवाली गिलहरियाँ हैं और जिनके बगल की खाल कुबग की तरह दोनों ओर काफी बढ गयी है। ये इसी खाल या झिल्ली को फँकाकर एक पेड़ से हवा में कूद पड़ती हैं और दूसरे पेड़ तक हवा में तैरती चली जाती हैं।

ये रात्रिचर जीव हैं जिनकी सब आदतें अन्य गिलहरियों की तरह होती हैं। हमारे यहाँ सूरजभगत नाम की उड़नेवाली गिलहरी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है।

सूरजभगत

(BROWN FLYING SQUIRREL)

सूरजभगत हमारे देश की उड़नेवाली गिलहरियों में से एक है। इसे कहीं कहीं उरल भी कहते हैं। यह हमारे देश में मध्यभारत से लेकर दक्षिण भारत तक के घने जंगलों में पाया जाता है।

सूरजभगत का कद लगभग डेढ़ फुट होता है जिसके इतनी ही बड़ी धुम भी होती है। इसके बदन के बाल काले और सफेद होते हैं जिनके मेल से इसका रंग झिल्ली ज्ञान पड़ता है। धुम काली या खैरी होती है और नीचे का हिस्सा सफेद रहता है। कभी-कभी हम सफेदी में कुछ राखीपन की भी मिलावट रहती है।

सूरजभगत के अगले पैर पिछले पैरों से एक प्रकार की झिल्ली से जुड़े रहते हैं जिसके सहारे वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में तैरकर चला जाता है। इसी से इसे कहीं कहीं 'उड़न-मूंग' भी कहा जाता है। यह जमीन पर बहुत कम उतरता है और उतरने पर जमीन पर उछल-उछलकर चलता है, लेकिन जब इसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो यह पेड़ की किसी ऊँची डाल पर चढ़ जाता है और वहाँ से कूदकर हवा में तैरता हुआ दूसरे पेड़ पर पहुँच जाता है। इसकी यह उड़ान कभी-कभी साठ गज तक पहुँच जाती है।

सूरजभगत रात्रिचर जीव है जो दिन में पेड़ के किमी मुरास या लोथे में घुसा रहता है और शाम होने पर अपने खाने की फिफ में बाहर निचलता है। यह ज्यादातर



उड़नेवाली गिलहरी (मूरख भगत पृ० ६४०)

ऐसे ही स्थानों में रहना पसन्द करता है जहाँ ऊँचे-ऊँचे पेड़ हों और इसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने में आसानी हो ।



सूरज भगत

सूरज भगत का मुख्य भोजन फल-फूल और पेड़ों की छाल है । इसके अलावा यह कीड़े-मकोड़ों को भी खाता है, लेकिन इसे गल्ले से परहेज है । इसकी मादा पेड़ के खोखों में बच्चे देती है ।

मूस समूह

(SECTION MYOMORPHIA)

इस दूसरी श्रेणी में सब प्रकार के चूहे एकर बिये गये हैं जिनके ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

यह श्रेणी पाँच परिवारों में बाँटी गयी है जिनमें से एक परिवार के जीव यहाँ अधिक पाये जाते हैं। यह मूस-परिवार कहलाता है।

मूस-परिवार

(FAMILY MURIDAE)

मूस-परिवार काफी बड़ा है जो कई उप-परिवारों में बाँटा गया है, लेकिन हमारे यहाँ केवल दो उप-परिवारों के जीव ही पाये जाते हैं।

१ मूस उपपरिवार—Sub Family Murinae

२ हिरनामूस उपपरिवार—Sub Family Gerbillinae

मूस उपपरिवार

(SUB FAMILY MURINAE)

मूस उपपरिवार में छाने-बछे सब प्रकार के चूहे एकर बिये गये हैं। इनमें एक नहीं, अनेक जातियाँ हैं। यहाँ अनेक यहाँ पाये जानेवाले प्रसिद्ध चूहों का वर्णन दिया जा रहा है।

बाला चूहा

(BLACK RAT)

बाले चूहे मारे मगर में फँसे हुए हैं। हमारे देश में भा शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ ये न पाये जाते हों। पहाड़ों पर ये आठ हजार फुट में ज्यादा ऊँची जगहों पर नहीं पाये जाते।

बाले चूहे का उपरी रंग काला या भूरा या गहरा भूरा होता है, लेकिन इनके पेट का रंग सफेद होता है। ये पाँच में आठ इंच लम्बे होते हैं और इनकी इनकी फी लम्बी दुम रहती है।

ये हमारे बहुत परिचित जीव हैं जो हमारे घरों में बिल बनावर रहते हैं। बाले-चूहे ये देश पर भी पाये जाते हैं। इनका मुख्य भोजन बीजों पर, फलों पर, सब्जियों पर, और छोटी-छोटी चीजों पर होता है। इनका मुख्य भोजन बीजों पर, फलों पर, सब्जियों पर, और छोटी-छोटी चीजों पर होता है।

चुहिया के बदन का ऊपरी हिस्सा हल्का या गाढ़ा भूरा होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा हल्का मिलेटी रहता है। कभी-कभी नीचे का हिस्सा सफेद भी रहता है।


चुहिया बहुत तेज और चालाक होती है। यह बँरो तो सर्वभक्षी जीव है, लेकिन यह अपना पेट ज्यादातर गल्ले आदि से भरती है। यह हमारी चीजों को कुतरकर हमारा बहुत नुकसान करती है।

इसकी मादा साल में चार-पाँच बार बच्चे देती है जिनकी संख्या प्रत्येक बार छ. से आठ तक रहती है।

मूस

(FIELD MOUSE)

मूस वैसे तो खेत का चूहा है और ज्यादातर खेतों और बाग-बगीचों में ही रहता है, लेकिन कभी-कभी यह खेत के पास के घरों में भी चला आता है। यह काले और भूरे चूहे से कद में कुछ छोटा होता है जिससे इसे पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती।



मूस

मूस वैसे तो हिन्द प्रायद्वीप का निवासी है, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में यह हमारे देश के अन्य स्थानों में भी पाया जाता है। हिमालय की ओर ज़रूर यह नहीं दिखाई पड़ता।

भूरा चूहा पांजे चूहे से बढ में कुछ बडा होता है और उसकी दुम काले चूहे से कुछ लम्बी रहती है। उसकी पीठ का रंग भूरा हॉंगा है जो ऊपर गहरा और बाज में हलका रहता है। नीचे का रंग सफेद, सफेदी मामल रहता है।


भूरा चूहा बहुत ढीठ जीव है जिसे आवादी के आम-याम ही रहना पसन्द है। यह घरों में और बाहर खेतों के आस-पास बिल बनाकर रहता है और हमारे गले और अन्य वस्तुओं का काफी नुकसान करता है।

यह सर्वभक्षी जीव है जिसकी मादा साल में कई बार बच्चे देती है और हर बार बच्चों की सख्या आठ से बारह तक हो जाती है।

चुहिया

(HOUSE MOUSE)

चुहिया हमारे देश में पंजाब, राजपूताना तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर सारे देश में फैली हुई है।



चुहिया

हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ चुहियाँ न दिखाई पड़ती हों। घरों के अलावा ये घर के आस-पास के खेतों और बाग-वगीचों में भी बली जाती हैं, लेकिन इनके रहने की मुख्य जगह हमारे घर ही हैं।

चुहिया बढ में चूहों से छोटी होती है। ये

ढाई-तीन इंच लम्बी होती है जिनके इतनी ही लम्बी दुम रहती है। इनके शरीर पर

चुहिया के वदन का ऊपरी हिस्सा हलका या गाढ़ा भूरा होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा हलका सिलेटी रहता है। कभी-कभी नीचे का हिस्सा सफेद भी रहता है।


चुहिया बहुत तेज और चालाक होती है। यह वैसे तो सर्वभक्षी जीव है, लेकिन यह अपना पेट ज्यादातर गल्ले आदि से भरती है। यह हमारी चीजों को कुतरकर हमारा बहुत नुकसान करती है।

इसकी मादा साल में चार-पाँच बार बच्चे देती है जिनकी संख्या प्रत्येक बार छः से आठ तक रहती है।

मूस

(FIELD MOUSE)

मूस वैसे तो खेत का चूहा है और ज्यादातर खेतों और वाग-वगीचों में ही रहता है, लेकिन कभी-कभी यह खेत के पास के घरों में भी चला आता है। यह काले और भूरे चूहे से कद में कुछ छोटा होता है जिससे इसे पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती।



मूस

मूस वैसे तो हिन्द प्रायद्वीप का निवासी है, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में यह हमारे देश के अन्य स्थानों में भी पाया जाता है। हिमालय की ओर ज़रूर यह नहीं दिखाई पड़ता।

मूँस का रंग कभी पिलछोह राखी और कभी मिलेटी भूरा रहता है, लेकिन नीचे का हिस्सा हमेशा सफेद रहता है। इसने शरीर के बाल छोटे और घने होते हैं।

मूँस का कद चूहों से कुछ छोटा और चुहियों से थोड़ा बड़ा होता है। इनकी ओर बाकी आदते काले और भूरे चूहों से मिलती-जुलती हैं।


इनकी मादा भी साल में कई बार बच्चे देती है, लेकिन इन बच्चों की संख्या प्रत्येक बार तीन-चार से ज्यादा नहीं होती।

घूस

(BANDICOOT RAT)

घूस हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खेत का चूहा है जो रातों में ही बिल बनाकर रहता है। यह आबादी के पास के खेतों में रहना पसन्द करता है जहाँ से इसे खेतों

और घरों में हमला करने की सुविधा रहती है।



हमारे यहाँ यह दक्षिण बंगाल और पंजाब को छोड़कर सारे देश में फैला हुआ है। इसका कद एक फुट से कुछ ज्यादा ही होता है जिसके लगभग एक फुट लम्बी दुम हाती है। इसका वजन भी सेर, सवा सेर से कम नहीं होता।

घूस

हिस्सा बलछोह भूरा रहता है जिसमें कभी-कभी मिलेटी बत्तक रहती है। नीचे का हिस्सा भूरापन लिये राखी भायल रहता है। इसने बाल कुछ बड़े और बड़े होते हैं जो कहीं-कहीं दो तीन इंच लम्बे हो जाते हैं।

घूस बस तो बड़ा आलसी चूहा है लेकिन मनुष्यों के लिए यही सबसे अधिक

हानिकारक माना जाता है। यह गल्ला और नाज के अलावा फल-फूल, मांस-अण्डे भी खाता है। इसकी मादा साल में कई बार आठ से दस बच्चे देती है।

हिरना मूसा उपपरिवार


(SUB FAMILY GERBILLINAE)

हिरनामूसा उपपरिवार में कई प्रकार के हिरनामूसा हैं, लेकिन हमारे देश में केवल एक प्रकार का ही हिरनामूसा पाया जाता है, जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

हिरनामूसा

(INDIAN GERBILLE)

हिरनामूसा को यह नाम इसलिए मिला है कि यह अपनी अगली छोटी और पिछली बड़ी टाँगों के कारण हिरन की तरह छलांगें मारता हुआ चलता है। इसकी पिछली टाँगें तो लगभग छः इंच की रहती हैं, लेकिन अगली एक इंच से बड़ी नहीं होती। यह देखने में कंगारू जैसा लगता है और उसी की तरह जब अपनी पिछली टाँगों पर खड़ा होता है तो अपनी दुम का सहारा लेता है। इसकी एक-एक छलांग चार-पाँच गज की होती है और छलांगें भरते समय ऐसा जान पड़ता है कि जैसे यह हवा में उड़ा जा रहा हो।



हिरनामूसा

हिरनामूसा हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है, लेकिन एक तो संख्या में कम दूसरे रात्रिचर होने के

कारण इसे हम कम देख पाते हैं। यह छः इंच का होता है जिसके लगभग सात, साढ़े सात इंच की लम्बी दुम होती है।

हिरनामूसा के वदन का रंग हलका ललछौंह भूरा होता है जिसमें कुछ राखीपन

की शलक रहती है। नीचे का हिस्सा सफेद रहता है और पीठ के निचले हिस्से के बाल कलछोह होते हैं।

हिरनामूसा मारा दिन बिल में बिनाकर रात को भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। इसका मुख्य भोजन घास, जड़ें, बीज और अनाज है। इसकी मादा मात में कई बार आठ-दस या उगमे भी अधिक बच्चे जनती है।

साही-समूह

(SECTION HYSTRICOMORPHA)

इस अन्तिम श्रेणी में सभी प्रकार की माहियाँ रखी गयी हैं जो सारे संसार में फैली हुई हैं। इस श्रेणी के जीवों की विशेषता उनके शरीर पर के बड़े बड़े जो बहुत तेज और मोरोले होते हैं और जिनसे वे अपनी आत्मरक्षा का काम भी लेती हैं।

यह श्रेणी बैसे तो कई परिवारों में विभक्त है, लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही परिवार के जीव पाये जाते हैं जो साही-परिवार कहलाता है।

साही-परिवार

(FAMILY HYSTRICIDAE)

साही-परिवार के जीव अपने ढंग के निराले हैं। अपने शरीर पर बड़े बड़े काँटों के कारण इन्हें पहचानना कठिन नहीं होता। इनका मुख्य भोजन फल-फूल और जड़ें हैं।


हमारे देश में एक ही जाति की माही पायी जाती है जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

साही

(PORCUPINE)

साही हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध जीव है जो अपने शरीर के काँटेदार कवच के कारण अन्य जीवों से सर्वथा भिन्न रहता है। यह रात्रिचर जीव है। इसी कारण इसे हम आसानी से नहीं देख पाते, लेकिन देहात में, जहाँ ये काफी संख्या में रहती हैं रात के समय लोगों की आँखों तले पड़ ही जाती हैं।

हमारे यहां खरगोश के कई नाम प्रचलित हैं। इन्हें कहीं नरगा कहते हैं तो कहीं चांगड़ा। विन्ध्य प्रदेश की ओर ये लम्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहीं-कहीं ये मना भी कहलाते हैं। ये अठारह-बीस इंच लम्बे जीव हैं जिनके तीन-चार इंच लम्बी टुम भी रहती हैं। इनका वजन दो बड़े मेर के लगभग होता है। मादा नर ने कद में कुछ बड़ी होती है।



खरगोश

खरगोश के बदन का ऊपरी हिस्सा हलका खैरा रहता है जिसमें पीठ के पास का हिस्सा स्याही मयल हो जाता है। इसका मुंह कलछाँह होता है, लेकिन सीने और टाँगों पर एक प्रकार की ललाई रहती है। इनके गले का कुछ हिस्सा और अगले पैर से नीचे का मारा भाग सफेद रहता है।

खरगोश तितरे-बिनरे जंगलों, झाड़ियों, घास के मैदानों, नदियों के पास के नालों या कछारों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। ये बिल खोदकर नहीं रहते बल्कि किसी झाड़ी या गढे में खतरा आने पर छिप जाते हैं।

खरगोश का मुख्य भोजन घास या नरम पौधे हैं इसीसे ये खेतों का बहुत नुकसान करते हैं। ये वैसे बहुत निरीह और सीधे जानवर हैं जो भागने में बहुत तेज होते हैं। भागते समय ये लम्बी-लम्बी छलाँगें भरते हैं क्योंकि इनकी पिछली टाँगें अगली टाँगों से बड़ी होती हैं।

इनकी मादा हर महीने एक से दो तक बच्चे देती है जिनकी आँखें पैदा होते समय खुली रहती हैं। इनके बच्चे भी छः महीने बाद बच्चे देने लगते हैं।

रंगदुनी-परिवार

(FAMILY OCHOTANIDAE)

इस छोटे परिवार में थोड़े ही जीव हैं जो कद में खरगोश से छोटे होते हैं। ये बहुत डरपोक सीधे और बहुसंतानी जीव हैं जो खरगोशों की तरह झाड़ियों में न रहकर जमीन में बिल खोदकर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है।

जान पड़ती है, लेकिन इसने पिछले हिस्से का मोटा चमड़ा जिसके साथ चर्वी की मोटी तह रहती है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है।

इसकी मादा एक बार में दो से चार तक बच्चे देती है जिनके वदन पर छोटे-छोटे मुंगायम काँटे रहते हैं। ये काँटे कुछ दिनों के बाद बड़े और बड़े होते हैं।

द्विदन्त उपवर्ग

(SUB ORDER DUPLICIDENTATA)

इस उपवर्ग के जीवों के ऊपरी जबड़ों में आगे की ओर दुहरे दाँतों की जोड़ी रहती है, जिसके कारण ये चूहों और मिलहरियों में अलग कर दिये गये हैं।

इनके वैसे तो कई परिवार और अनेक जातियाँ हैं जो सारे ससार में फैली हुई हैं लेकिन हमारे यहाँ इनके दो ही परिवारों के जीव पाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं।

१ खरगोश-परिवार—Family Leporidae

२ रगदुनी-परिवार—Family Ochotanidae

खरगोश-परिवार

(FAMILY LEPORIDAE)

खरगोश परिवार काफी बड़ा है जिसमें सारे ससार के खरगोशों को एकत्र किया गया है। इनकी एक मही, अनेक जातियाँ हैं जो सारे ससार में फैली हुई हैं। यूरोप ही में इनकी बीसियों जातियाँ हैं। इनका शरीर मूलायम रोयाँ से ढँका रहता है और इनके कान बड़े होते हैं।

यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध खरगोश का वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ सारे देश में फैला हुआ है।


खरगोश

(HARE)

खरगोश हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर रहने के कारण इनकी यहाँ कई जातियाँ हो गयी हैं, फिर भी इनकी रक्त-मदन स्वभाव तथा शकल-रंग-जैसी ही होती है।

हमारे देश में साही ऊँचे पहाड़ों को छोड़कर प्रायः सभी स्थानों में पायी जाती है। यह ज्यादातर ऊँचे-नीचे भीटों में विल खोदकर रहती है और इनके विल काफी लम्बे और कई शाखाओंवाले होते हैं।

साही का कद करीब तीस इंच लम्बा होता है जो एक प्रकार के कड़े काँटों से ढँका रहता है। इसकी दुम वैसे तो चार-पाँच इंच लम्बी होती है लेकिन काँटों के साथ उसकी लम्बाई भी सात-आठ इंच तक पहुँच जाती है।



साही

साही का शरीर कलछोह भूरे रंग का होता है जो काले और सफेद काँटों से भरा रहता है। इसके सिर पर कड़े वालों का गुच्छा सा रहता है और थूथन पर भी कड़े वाल रहते हैं। पीठ पर बड़े-बड़े काँटे रहते हैं जो पतले और लचीले होते हैं।

साही के शरीर के पिछले हिस्से के काँटों के नीचे कुछ छोटे काँटे भी रहते हैं जो मोटे, कड़े और बहुत नोकीले होते हैं। इन्हें उसी समय देखा जा सकता है जब साही अपनी रक्षा के लिए उन्हें खड़ा कर लेती है। ये काँटे काले रंग के होते हैं जिनमें कई जगह सफेद धारियाँ पड़ी रहती हैं। साही की दुम के पास के कुछ काँटे छोटे, चौड़े और खोखले होते हैं जो आत्मरक्षा के समय एक तरह की आवाज करने लगते हैं।

साही बहुत सीधी और शान्त जानवर है जो किसी पर अकारण आक्रमण नहीं करती, लेकिन जब उस पर कोई हमला करता है तो वह मजबूरन अपने काँटे खड़े करके अपनी दुम उसकी ओर कर देती है। यह शाकाहारी जीव है जिसे जड़वाली चीजें बहुत पसन्द हैं। हमारे खेतों और बागों का यह बहुत नुकसान करती है और इससे आलू, शकरकंद आदि जड़वाली फसलों को बचाना मुश्किल हो जाता है।

साही का मांस मामूली होता है, जिसमें एक प्रकार की मिट्टी की-सी खसखसाहट

जान पड़ता है कि यह इगल गिर्जा में वा मांग नमदा जिनका माध पर्वी का मांग
गर्जा है गात म बहुत स्थापित होता है ।

इगली मांगला बाग में पाया जाता है । यह है जिनका वन पर छाया-छाया
मांगला तो नहीं है । यह बाग में पाया जाता है और बाग में होता है ।

जिनका उपयोग

(SUB CRIBED DICHIDINATA)

इगल उपयोग के पीछे व ऊपर उक्त म जाग का आर दन्दे पीना की जाता है
है जिनका कारण यह है कि आर गिर्जा में अन्न वन गिर्जा है ।

इनका वन मा वर्द्ध परिवार और अन्न जातिवा है जो गार मगार म फला हुआ है
जिनका हमारा वन है जो ही परिवार का जाग पाया जाने है जो इगल प्रकार है ।

१ सरगांग परिवार—Family Lycopodiaceae

२ रगदुना परिवार—Family Ochetanidae

सरगांग परिवार

(FAMILY Lycopodiaceae)

सरगांग परिवार काफी बड़ा है जिनका गारे समार व सरगांग का एकत्र किया
गया है । इनकी एक नहा अन्न जातिवा है जो सारे मसार म फला हुआ है । यरोव
ही म इनकी बीमिया जातिवा है । इनका गरीर मूल्यम रोया म उका रहता है और
इनके वान बड़ा होता है ।


यही अन्न यहाँ के प्रसिद्ध सरगांग का वनन लिया जा रहा है जो हमारे यहाँ
सारे म म फला हुआ है ।

सरगांग

(HARE)

सरगांग हमारे देश म प्राय सभी स्थानों म पाया जाता है लेकिन अलग-अलग
स्थानों पर रहने के कारण इनकी यहाँ कई जातियाँ हो गयी हैं फिर भी इनकी
रहने सहने स्वभाव तथा शकल मूलत एक जमी ही होती है ।

हमारे यहाँ खरगोश के कई नाम प्रचलित हैं। इन्हें कहीं खरहा कहते हैं तो कहीं चांगड़ा। विन्ध्य प्रदेश की ओर ये लमहा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहीं-कहीं ये ससा भी कहलाते हैं। ये अठारह-बीस इंच लम्बे जीव हैं जिनके तीन-चार इंच लम्बी दुम भी रहती है। इनका वजन दो दार्ड सेर के लगभग होता है। मादा नर से कद में कुछ बड़ी होती है।



खरगोश

खरगोश के वदन का ऊपरी हिस्सा हलका खैरा रहता है जिसमें पीठ के पास का हिस्सा स्याही मायल हो जाता है। इसका मुँह कलछाँह होता है, लेकिन सीने और टाँगों पर एक प्रकार की ललाई रहती है। इनके गले का कुछ हिस्सा और अगले पैर से नीचे का सारा भाग सफेद रहता है।

खरगोश तितरे-वितरे जंगलों, झाड़ियों, घास के मैदानों, नदियों के पास के नालों या कछारों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। ये बिल खोदकर नहीं रहते बल्कि किसी झाड़ी या गढे में खतरा आने पर छिप जाते हैं।

खरगोश का मुख्य भोजन घास या नरम पौधे हैं इसीसे ये खेतों का बहुत नुकसान करते हैं। ये वैसे बहुत निरीह और सीधे जानवर हैं जो भागने में बहुत तेज होते हैं। भागते समय ये लम्बी-लम्बी छलाँगें भरते हैं क्योंकि इनकी पिछली टाँगें अगली टाँगों से बड़ी होती हैं।

इनकी मादा हर महीने एक से दो तक बच्चे देती है जिनकी आँखें पैदा होते समय खुली रहती हैं। इनके बच्चे भी छः महीने बाद बच्चे देने लगते हैं।

रंगदुनी-परिवार

(FAMILY OCHOTANIDAE)

इस छोटे परिवार में थोड़े ही जीव हैं जो कद में खरगोश से छोटे होते हैं। ये बहुत डरपोक सीधे और बहुसंतानी जीव हैं जो खरगोशों की तरह झाड़ियों में न छिपकर जमीन में बिल खोदकर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन घास-पात है।

हमार यही इतनी जा एग प्रसिद्ध जाति पाया जाता है यहाँ उगी का बरत दिया जा रंग है।

रगदुनी

(HILL OR HOLEY HARE)

रगदुनी का पगड़ी सरलान कहा जाय ता अनुचित न होना। हमार यही प हिमालय प्रांत में बदमार म लखर पुर पूरव ता पंग हूत है। हिमालय का छोकर दहें देग में और कहा नहीं दता जा सकना। और यही भी ये १२ स १५ हजार पुर तन पाय जान हैं।



रगदुनी

नीच का हिस्सा सफ़ी मायल रहता है और पैर तथा दोनों बगरी हिस्स भरे रहते हैं।

रगदुनी गरोह बांधकर रहनवाले जीव हैं जा अक्सर एस पयरीके मदानी म रहते हैं जहाँ वे आसानी से बिल बना सकें या पयरा के बीच छिप सकें। य ज्यागर चीड के डलुए जगला म रहते हैं और आहट पाते ही फौरन अपन बिल म घस जाते ह। इनका मुख्य भोजन घास पात है।

रगदुनी की मादा एक बार में तीन चार बच्चे दती है।

रगदुनी सरलान क भारी-बाधु ह तैकिन इनके बान सरलान का तरह लव नहा होन। इस तो इनक हाती ही नहा। रगदुनी का बही-नही रगमूर भा बहते हैं। यह लगभग छ इस लबा हाता है। इसका ऊपरी हिस्सा कपई भूरे रंग का हाता है जिसम कभा कभी मिलेटी या कल छोह मिलावट रहती है।

मांसभक्षी वर्ग

(ORDER CARNIVORA)

मांसभक्षी-वर्ग में, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, सब प्रकार के मांसभक्षी जीवों को एकत्र किया गया है जिसमें बाघ, नेंदुआ, भेड़िया, सियार, लकड़बग्घे तथा कुत्ते और बिल्लियां हैं।

यह वर्ग शक-वर्ग को छोड़ कर स्तनपायी-जीवों का सब से बड़ा वर्ग है जिसमें के प्राणी बहुत तेज, खूंखार आक्रमणकारी और फुरतीले होते हैं। यही नहीं, ये सब बहुत चालाक होते हैं और बुद्धिमत्ता में वंदरों के बाद फिर इन्हीं का नम्बर आता है।

मांसाहारी होने पर भी तिमि या ह्वेल को इस वर्ग से इसलिए अलग कर दिया गया है क्योंकि उसका केवल निवास ही नहीं बल्कि उसकी और बहुत-सी आदतें भी इन मांसभक्षी जीवों से भिन्न हैं। इसी प्रकार भालू आदि कुछ जीव इस वर्ग में ले लिये गये हैं जो मांस के अलावा फल-फूल और गह्व आदि से भी अपना पेट भर लेते हैं।

इस वर्ग के सभी प्राणियों की उँगलियों में तेज नाखून होते हैं। इन उँगलियों की संख्या चार से कम नहीं होती। इनके पंजों की बनावट ऐसी होती है कि ये जब चाहें अपने तेज नाखून को भीतर छिपा सकते हैं। इनके पैर के तलवे गद्देदार होते हैं जिसके कारण इनके चलने में जरा भी आहट नहीं होती और ये आसानी से अपने शिकार के पास तक पहुँच जाते हैं।

इनके दाँत खास तौर पर शिकार पकड़ने के लिए ही बनाये गये हैं जो आसानी से उसे चीड़फाड़ डालते हैं। इनके आगे के दाँत तो छोटे होते हैं, लेकिन दोनों बगल के कुकुरदन्त बड़े और मजबूत होते हैं।

इन जानवरों के सूँघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है जिससे उन्हें अपने शिकार में काफी मदद मिलती है। इनमें से अधिकांश का वदन छरहरा होता है जिससे ये बहुत तेज दौड़ लेते हैं। इनकी जवान बहुत खुरखुरी होती है जिससे हड्डी पर का गोश्त हटाने में इन्हें काफी सहाय्य हो जाती है।

इस वर्ग के जीव आस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को छोड़कर सारे संसार में फैले हुए हैं। यह वर्ग दो उपवर्गों में इस प्रकार विभाजित किया गया है :—

१. बिल्ली उपवर्ग—Sub Order Vera

२. सील उपवर्ग—Sub Order Pinnipedia

मील-उपवर्ग के जीव हमारे देश में नहीं पाये जाते, इसमें हम विल्ली उपवर्ग को ही ले रहे हैं।

विल्ली उपवर्ग

(SUB ORDER VERA)

विल्ली उपवर्ग काफी विस्तृत है, इसीलिए विद्वानों ने इसे तीन समूहों में इस प्रकार बाँटा है।

१ विल्ली-समूह—Section Acluroidea

२ कुत्ता-समूह—Section Sytnoidea

३ भालू-समूह—Section Arctoidea

यहाँ इन तीनों समूहों का अलग-अलग वर्णन दिया गया है और पक्षेय के साथ उनके प्रसिद्ध जीवों को रखा गया है।

विल्ली-समूह

(SECTION ACLUROIDEA)

विल्ली-समूह अन्य दोनों समूहों से बड़ा है। इसीलिए उसका विभाजन चार परिवारों में, उनकी विशेषता के अनुसार, किया गया है, लेकिन यहाँ उनमें से केवल तीन परिवारों का वर्णन दिया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में इन्हीं तीनों परिवारों के जीव पाये जाते हैं। ये तीनों इस प्रकार हैं—

१ बिल्ली परिवार—Family Felidae

२ कस्तूरी-परिवार—Family Viverridae

३ लकड़बग्घा-परिवार—Family Hyacnidae

विल्ली-परिवार

(FAMILY FELIDAE)


इस बड़े परिवार के सभी जीव पूर्णरूप से मांसभक्षी हैं जिसमें सिंह से लेकर बिल्ली तक शामिल हैं। इन जीवों के कुकुरदन्त अन्य जानवरों से बड़े और नोकीले होते हैं जैसे वे मांस भक्षण के लिए ही बनाये गये हों। उनमें काफी तेज धार होती है जिससे वे आसानी से मांस काट सकते हैं।

वे मानवकी पशु जैसे तो रात्रिचारी होने हैं, लेकिन इनमें मे कुछ को दिन में भी घूमने-फिरने देखा जा सकता है। इनकी आंखों की पुतलियों में फैल कर बड़ी हो जाने की शक्ति होती है जिससे वे थोड़ी रातनी में भी बहुत कुछ देख सकते हैं। अंधेरे में चलने समय इनको आंखों में ज्यादा अपनी सूंछों से सहायता मिलती है जिन्हें ये अंधेरे में फैलाकर चलाते हैं। ये सूंछें भी इनकी स्पर्शन्द्रियां हैं। ये जीव संसार के प्रायः सभी भागों में पाये जाते हैं। यहां इन परिवार के मुख्य-मुख्य जीवों का वर्णन दिया जा रहा है।

सिंह

(LION)

सिंह हमारे यहाँ का प्रसिद्ध राजगी पशु है जिसे हमारे देश में सदा से राज्यचिह्नों में स्थान पाने का गौरव प्राप्त है। इस समय भी हमारे स्वतन्त्र भारत के राज्यचिह्न में इसी की मूर्ति रखी गयी है। इसे जंगल का राजा कहना कोई अत्युक्ति नहीं।



सिंह

सिंह को उसके कंधे पर के बड़े-बड़े वालों या केसर के कारण केसरी भी कहते हैं। कहीं-कहीं यह शेर-ववर भी कहलाता है। हमारे देश में सिंह अब बहुत थोड़ी संख्या में रह गये हैं। लेकिन अफ्रीका के जंगलों में ये अब भी काफी संख्या में हैं। इस देश में तो ये सिर्फ काठियावाड़ के पहाड़ी गोर जंगल में ही रह गये हैं जहाँ इनकी संख्या सौ, दो

सी से अधिक नहीं आँकी जाती। कभी-कभी ये उदयपुर और जोधपुर के आम पान तथा आरू पट्टाई में भी मिल जाते हैं। लेकिन यदि सरकार द्वारा इनकी रक्षा का प्रयत्न न किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब ये हमारे देश में एव दम लुप्त हो जायेंगे।

मिह बाघ की तरह पने जंगलों में रहना उसना पगन्द नहीं करते जितना घाम के रातले मैदानों में। द्रगीलिए इनको प्रवृत्ति में घारीदार पीछाव न देकर भूरी पीछाव दी है जो घाग के मैदानों के लिए बहुत उन्मुख है। इनका गिर चपटा और बग्न होता है और इनकी शक्ल बिल्ली से मिलती जुलती न होकर कुत्तो से मिलती जुलती है। गर के कंधे पर लगभग एक फुट लम्बे बाल या अयाल होते हैं जिनसे इनका चेहरा बहुत रोबीला और भयानक लगने लगता है। इनकी दुम के सिरे पर गाय-बैल की तरह बाले बालों का गुच्छा-मा रहता है। इनका गारा शरीर सुनहला या पिल्लौट भूरा रहता है, पान के बाहरी हिस्से की जड़ के पाग कुछ स्याही रहती है और बचपन में अयाल के बालों के निरे भी बाले रहने हैं। बच्चों के बदन पर धारियाँ-भी पड़ी रहती हैं जो उनके बड़े होने पर गायब हो जाती हैं।

सिंह बरीब छ, माडे छ फुट लम्बे होते हैं जिनके ढाई-तीन फुट लम्बी दुम रहती है। ऊँचाई में भी ये तीन, माडे तीन फुट तक के पाये गये हैं। मिहनी सिंह से ब्रहर कुछ छोटी होती है। सिंह बाघ से ऊँचे होकर भी उतने भारी, कड़ावर और मजबूत नहीं होते और न ये बाघ की तरह खूँवार और चालाक ही होते हैं। लेकिन इनमें साहस की कमी नहीं रहती। बाघ जहाँ शिकार के समय छिपने की कोशिश करता है वहीं मिह बहादुरी से सामने आकर आक्रमण करता है।

सिंह बग्न बहादुर जानवर है जो अपने से बड़े जानवरी को बड़ी आसानी से मार गिराता है। इसकी गरज बाघ से कही तेज होती है जिसे हम घाम को और रात में अक्सर सुन सकते हैं। इनके दहाडने से इनके रहने का पता आसानी से लग जाता है क्योंकि ये प्रायः एक नियत समय पर नित्य दहाडा करते हैं।

सिंह सबसे अलग-अलग भी रहते हैं, लेकिन जोड़ा बांध केने पर ये मादा के साथ ही दिखाई पड़ने ह। अफ्रीका आदि में, जहाँ इनकी अधिक संख्या है, ये गरौह बांधकर शिकार करते हैं। इनका मुख्य भोजन घास है, लेकिन ये मुर्दाखोर नहीं होत और सदैव अपना ही मारा शिकार खाते हैं।




(263 04) 1112

सिंहनी आठ महीने पर दो-तीन बच्चे जनती है जिनकी आँखें शुरू से ही खुली रहती हैं। ये बच्चे पाँच-छः महीने तक अपनी मा के साथ रहकर अपना अलग जीवन बिताने के लिए उससे अलग हो जाते हैं।

बाघ

(TIGER)

बाघ या शेर हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जानवर है जिसे सिंहों की कमी के कारण अब जंगलों का राजा कहना ठीक ही है। इसको हमने जंगल में भले ही न देखा हो, लेकिन हममें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसकी तस्वीर भी न देखी हो। बहुतों को तो चिड़ियाखानों में इसके दर्शन भी हो गये होंगे।



बाघ

हमारे देश के घने जंगलों में आज बाघ का ही एकछत्र राज्य है। काफी शिकार होने के कारण अब इनकी संख्या धीरे-धीरे कम जरूर होती जा रही है लेकिन सिंहों की तरह इनके एकदम लोप हो जाने का खतरा अभी निकट भविष्य में नहीं है। बंगाल, मध्यप्रदेश और बंबई के जंगलों में इनका काफी शिकार हुआ है और वहाँ ये कम भी हो गये हैं, लेकिन हिमालय की तराई के घने जंगलों में ये आज भी काफी संख्या में फैले हुए हैं। हिमालय पर ये छः-सात हजार फुट से ज्यादा ऊँचाई पर जाना नहीं पसन्द करते, लेकिन इतनी ऊँचाई तक तो इनका आतंक रहता ही है।

बाघ की औसत लम्बाई साढ़े पाँच फुट से छः फुट तक रहती है। इसके अलावा इनकी दुम भी ढाई-तीन फुट की होती है। ऊँचाई में ये सिंह से कुछ छोटे तीन, सवा तीन फुट तक होते हैं। इनकी दुम बिल्लियों की तरह सादी ही रहती है। इनके बदन का

रग वादामी रहता है जिसपर आडी आगे घागियां पड़ी रहती हैं। दुम भा वादामी नापी है जो वाग गन्गिया मे भरा रहता है। इसर वान का वादरी हिम्मा वाग रहता है जिसपर एग गफर रिता रहता है। ना १ व कुठ रिम्मा की जमीन मफर रहती है।

बाघ एक मादा म जाग रां मर रहनेवाठ जीव है जो कभी जेठ जोरवमी जाठ म दिवार्द पन्न है। य अपना दिन का साग समय किसी घनी और मापेदार जगह में रिवाज रात म अपन गिजार व लिग बाह्य निक्कत है और मारा रात गिजार का नडाग म बक्कर लगान रहत है। गरमिया में ये पानी व आम-गाम ही रहत है लकिन जाठ और बरमान म मार जग म पन्न जान है।

बाघ का मुख्य भाजन मांस है जिसके लिए ये माही मुअर हिरत माभर और गाय जैल भादि का गिजार करत है। मुल रहने पर ये बन्दर और मार आदि का भी नहीं छाडत। य गिजार करत समय अपने म ऊँच जानवरा की गरदन नीचे म पन्न वर बडा फुरता म उसका पाठ की दूसरा आर बूद जान है जिसम गिजार की गरदन एठकर टूट जाती है। यह मय इनने आनन फानन हाता है कि दक्क ही घन्ता है। छाठ माठ जानवरा को ता य एव थपडे में ही खतम कर देने हैं। बूड बाघ जब जगला जानवरा को नहीं मार पात ता ये आदमखार हा जाने हैं। घेरमिया भी अमर आदम खार दबा गयी है। एव बार आदमी का खून जवान पर लगने पर ये फिर आश्चर्यो का पकडन लगने हैं थपकि आदमा स अधिर आमानी उ हे किसी शिकार म नहीं हायी।

हमारे यही इनने गिजार क दा प्रसिद्ध तरीक है। एव ता होके द्वारा और दूसरा मरा पर बैठकर। हाक का गिजार मचान पर बैठकर होता है। इसमें एव जोर ऊंचे पेडा पर मचान बाध दिय जान है और दूसरी आर स मैक्का आदमा डोल तागा आदि उकर शार मचात हुए मचाना को आर आत है। व बाध बीच में पडा का ठाकते और पगल आदि दागते आते हैं जिसमे गर आग-आग चलकर मचान की आर बला जाय। जब शर मचान व करोड पहुँच जाता है ता उस पर शिकारी लाग गाली चलाकर उस मार त्त है।

मरी (Kill) क गिजार क लिए शिकारी जगला में बटरे या भँस बाध देने हैं। जब शर उस मार लता है तो दूसरे दिन उसी क पास किसी पड पर मचान बाध दिया जाता है। दूसरे दिन रात को जब शर बचे हुए मास का खान के लिए उस जगह आता है तो उसे मचान पर स गोत्रिया का शिकार बना लिया जाता है।

इसके अलावा तराई की ओर जहाँ घास के बड़े-बड़े मैदान हैं बाघ का शिकार हाथियों से घेरकर किया जाता है और अब तो इनका शिकार रात में मोटर पर चढ़कर भी काफी होने लगा है। रात में मोटर की तेज लाइट या सर्च लाइट के मामले घेर बाँधिया कर खड़ा हो जाता है और तब उसे मोटर पर बैठे-बैठे मार लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं रह जाती।

बाघिन लगभग चार महीने बाद दो से छः तक बच्चे देती है। उसके बच्चे देने का साल में कोई निश्चित समय नहीं है। इसी से इनके बच्चे हमको प्रायः हर समय दिखाई पड़ते हैं। बच्चे काफी बड़े होने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं जो उन्हें शिकार खेलना सिखाती है।

तेंदुआ

(LEOPARD)

तेंदुआ को शेर का भाई-बन्धु कहना ठीक होगा। कद में शेर से छोटे होते हुए भी ये चालाकी और फुर्ती में उससे आगे ही रहते हैं। हमारे देश में ये पंजाब को छोड़कर सभी घने जंगलों में पाये जाते हैं। यही नहीं, ये कभी-कभी खादड़ और ऐसे तितरे-तितरे जंगलों में भी चले आते हैं जहाँ शेर कभी नहीं आता।



तेंदुआ

तेंदुआ हमारा बहुत ही परिचित जीव है जो चार-पाँच फुट लम्बा और करीब दो

फुट ऊँचा होता है। इसके तीन फुट लम्बी डुम होनी है। इसका बदन बहुत गठीला और मुडौल होता है और इसकी शक्ल विल्लियो-जैसी रहती है।

तेंदुआ का बदन हलका बादामी या हलका भूरा रहता है जिसमें सुर्गों मात्र सफेदी मिली रहती है। नीचे का रंग एकदम सफेद रहता है। इसका साग बदन मोल चितिया या गुलों में भरा रहता है जिममें भिर, पेट और पैर के निचले हिस्से की चित्तियाँ तो घुर वाली होनी हैं, लेकिन पीठ, डुम और दोनों बगल के गुल छन्दनुमा रहते हैं और उनके बीच का रंग पोला रहता है। इन्ही गुलों के कारण इन्हें कही-वहीं गुलदार भी कहा जाता है। वध्वे भूरे रंग के होने हैं और उनके बदन पर के गुल गुह में हलके रंग के रहते हैं।

तेंदुआ दिन में किसी घने जंगल की खोह या मायेदार स्थान में छिपा रहता है और रात होने ही गिबार के लिए बाहर निकलता है। यह बहुत ही सतर्क और सनरनाक जानवर है जिसमें गजब की चालाकी होनी है। इसमें इतना साहस नहीं होता और यह सनरा निकट देख कर भागने या छिपने की कोशिश करता है। यह पौर के भीतर आकर आदमियों पर हमला नहीं करता, लेकिन चोरी से मुरगियों, बत्तों और अनेक जानवरों को उठा ले जाता है। यह वैसे तो बदर, सुअर और हिरन आदि का गिबार करता है, लेकिन भूगा रहने पर गाँव के कुत्तों और अन्य पालतू पशु-पक्षियों को भी सारथर अपना पेट भरता है।

तेंदुआ बहुत पृथ्वीला जानवर है जो काफी लम्बी छलाँगें मारता है और पर्वत पर भी आगामी स चढ़ जाता है। यही नहीं, यह पानी में तैरने में भी तेर की तरह उस्ता होता है। कभी-कभी यह अपने गिबार की गेट पर ले जाकर रण देता है और कभी कई दिन में उगे जाता है।

इसकी मादा एक बार में दो में चार तक बच्चे देती है।


माह

(SNOW LEOPARD)

माह का हिमालय का या बर्फ का तेंदुआ कठे गो अनुचित न होना चाहिये वह केवल हिमालय में छ-जान जगह पृष्ठ ऊँच जगहों में पाया जाता है।

यह सगमग का पृष्ठ लम्बा जानवर है जो बहुत गठीला और मुडौल होता है। यह दो फुट ऊँचा होता है जिसकी डुम करीब तीन फुट लम्बी रहती है। इसका रंग

सफेदी मायल राख-जैसा होता है जिसमें कभी-कभी पीलेपन की कुछ झलक रहती है। इसके वदन पर बड़े और काले छल्लेनुमा गुल पड़े रहते हैं, जो देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं। इसके वदन के बाल काफी बड़े होते हैं और दुम के सिरे के पास बालों का एक गुच्छा-सा रहता है; नीचे का सारा हिस्सा गंदा सफेदी मायल रहता है जिस पर पेट के पास कुछ गहरे रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। इसके कान का बाहरी हिस्सा काला रहता है।



साह

साह वैसे तो मांसाहारी और हिंसक जीव है लेकिन यह आदमियों पर हमला नहीं करता। यह वर्ष के निकट रहनेवाली जंगली भेंड़-वकरियों को मारकर अपना पेट भरता है।

इसकी और सब आदतें तेंदुओं से मिलती-जुलती होती हैं। इससे उन्हें फिर से बुराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

लमचित्ता

(CLOUDED LEOPARD)

लमचित्ता भी हिमालय का निवासी है जो हिमालय के पूर्वी हिस्सों में लगभग सात हजार फुट के ऊँचे जंगलों में पाया जाता है। इसके पैर कुछ छोटे होने के कारण देखने में यह लम्बा जान पड़ता है। इसीसे शायद इसे लमचित्ता कहा जाता है। कुछ लोग इसके वदन पर के लम्बे चित्तों के कारण इसको लमछिट्टा भी कहते हैं।

लम्बिता करीब तीन फुट लम्बा जानवर है, जो ऊँचाई में एक या सवा फुट से ज्यादा नहीं होता। इसकी दुम भी करीब ढाई-तीन फुट से ज्यादा लम्बी नहीं होती, जो विन्लियों की तरह सादी ही रहती है। यह बहुत सुन्दर जानवर है जिसके रंग का वर्णन करना बहुत कठिन है। इसके बदन का रंग पिन्डलीह भूरा या हल्का बादामी रहता है, जिसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े काले बिन्दु रहते हैं जो देखने में बहुत ही भले मालूम होते हैं जैसे पोली जमीन पर काले बादल से उठ रहे हों। इसके पैरों का भीतरी हिस्सा सफेद रहता है और बदन का निचला हिस्सा हल्का हो जाता है। गरदन और दोनों गालों पर काली धारियाँ रहती हैं और गले पर एक काली पट्टी साफ धमकती रहती है। इसकी दुम काफी लम्बी और झबरी होती है, जिस पर गहरे रंग के छत्ते पड़े रहते हैं। इसका बदन भारी, गठीला और मुडील होता है और इसने शरीर पर के रोम बड़े न होकर छोटे ही रहते हैं।

लम्बिता अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताता है, जहाँ वह किसी दुपकी डाल पर बैठा रहता है। रात को भी यह पेड़ों पर ही सोता है और पेड़ों पर ही घूम-कर चिड़िया को पकड़ता है। चिड़ियों के अलावा यह छोटे-मोटे जानवरों का भी शिकार करता है, लेकिन बड़े जानवरों और आदिमियों पर हमला करने की हिम्मत इसे नहीं पड़ती।

इसकी अन्य आदतें तेडुए तथा माह स मिलनी-जुलती होती हैं।


सिकमार

(MARBLED CAT)

सिकमार विन्ली के कद का छाटा-गा जानवर है। इसलिए इसे शेर और तेडुए की श्रेणी में न रखकर विन्लियों की श्रेणी में ही रखना अधिक उपयुक्त होगा। यह डेढ़-दो फुट से अधिक लम्बा नहीं होता और इसके करीब सवा फुट लम्बी झबरी दुम होती है। इसके अंग घरेलू विन्लियों से बड़ी ज्यादा मजबूत होते हैं और यह तावत और फुरती में भी उनसे आगे रहता है।

सिकमार का रंग लम्बितों से मिलता-जुलता रहता है और दूर से देखने पर यह उसका बच्चा जान पड़ता है। इसके बदन का रंग गदा लन्छीह रहता है जिसमें भूरे रंग की मिश्रण रहती है। सारे बदन पर बहुत से लम्बे लम्बे काले धब्बे रहते हैं जो देखने

में लहर-मे जान पड़ते हैं। सिर और गुद्दी पर पतली-पतली धारियाँ रहती हैं जो दुम तक फैल जाती हैं। इसकी जाँघों के भीतरी हिस्से में काली चित्तियाँ रहती हैं और दुम पर काली गड़ारियाँ पड़ी रहती हैं। पेट का हिस्सा पिलछाँह सफेद रहता है। इसके वदन के बाल काफी नरम होते हैं जिसके नीचे मुलायम रोओं की एक तह भी रहती है।



सिकमार

सिकमार बहुत शरमीला जानवर है जिसका मुख्य भोजन मांस है। यह गुस्सा होने पर खौफनाक जलूर हो जाता है, लेकिन वैसे खतरे को निकट देखकर छिपकर भागने की ही कोशिश करता है। इसकी मादा विल्लियों की तरह कई बच्चे देती है।

वाघदशा

(FISHING CAT)

वाघदशा भी जंगली विल्लियों में से एक है जिसे बंगाल में माछ-विड़ाल और कहीं-कहीं वाघडाँशा वरीन या खुपियावाघ भी कहते हैं। हमारे यहाँ ये हिमालय की तराई में काफी संख्या में पाये जाते हैं, वैसे ये बंगाल से लेकर पंजाब तक उत्तरी भारत में और मालाबार तट की ओर दक्षिण भारत में फैले हुए हैं।

वाघडाँशा करीब ढाई फुट लम्बा और सवा फुट ऊँचा जानवर है जिसके दस-ग्यारह ईंच लम्बी दुम होती है। इसके वदन का रंग सिलेटी होता है जिसमें हलकी भूरी झलक रहती है। सारा वदन गहरे रंग की चित्तियों से भरा रहता है जो पीठ और गरदन पर तो अण्डाकार और सिलसिलेवार रहती हैं, लेकिन शरीर के और स्थानों पर इनकी

शकल गोल हो जाती है। वहाँ ये बेतरतीबी से इधर-उधर फैली रहती हैं। इसके गाँठ का रंग सफेद रहता है जिस पर काली धारियाँ पड़ी रहती हैं। पेट का रंग मटमला सफेद होता है जिस पर सीने के पास पाँच-छ गहरे रंग की पट्टियाँ और बाकी हिस्से में चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। डुम पर कई छल्ले पड़े रहते हैं, लेकिन उसका सिरा काला ही रहता है।



बाघदशा

बाघदशा हमारे यहाँ की जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ा, खूँवार और तेज होता है। यह प्रायः पानी और दण्डलो के आसपास ही रहना पसन्द करता है क्योंकि इसका मुख्य भोजन घाने, कछुए और मछलियाँ आदि हैं। इसके अलावा यह चिड़ियों और छाटे-छाटे जानवरों का भी शिकार करता है और कभी-कभी डीठ हों जाने पर यह आदमियों के एक-दो महीने के बच्चों को भी उठा ले जाता है। भूता रहने पर यह भेन्-बकरियों और कुत्ता पर भी हमला कर बैठता है।

इसकी मादा अन्य बिल्लियों की तरह दो चार बच्चे जनती है।


तेंदुआबिल्ली

(LEOPARD CAT)

तेंदुआबिल्ली तेंदुआ के बराबर नहीं होती, बल्कि इसका बंद बाघदशा से छोटा और लम्बी पंखें चित्तियों के ही समान रहता है। इसे पहाड़ी स्थान बहुत पसन्द

है और यह अपना अधिक समय घने जंगलों में ही बिताती है। वहाँ यह ज्यादातर पेड़ों पर ही रहती है।

इसके बदन का रंग हलका भूरा होता है जिन पर काली या गाढ़ी भूरी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। नीचे का हिस्सा मफेद रहता है। इसकी गरदन और गुद्दी पर काली धारियाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन दुम और पैरों पर धारियों का स्थान काली चित्तियाँ ले लेती हैं।



तेंदुआविल्ली

तेंदुआविल्ली दिन में किसी खोये या सूराख में घुसी रहती है, लेकिन रात को यह शिकार के लिए बाहर निकलती है और तब यह जंगलों के अलावा आस-पास की आबा-दियों में भी पहुँच जाती है। वहाँ पर यह पालतू मुगियों, बत्खों और खरगोशों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। जंगल में भी यह छोटी-मोटी चिड़ियों और जानवरों को मारकर अपना पेट भरती है।


इसकी मादा एक बार में तीन-चार बच्चे देती है जो छुटपन में भूरे रंग के रहते हैं।

वनबिलार

(JUNGLE CAT)

वनबिलार यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जंगली बिल्ली है जो हमारे देश के प्रायः सभी घने और तितरे-वितरे जंगलों में पायी जाती है। हिमालय में भी यह सात-आठ हजार

फुट की ऊँचाई तक पहुँच जाती है और जंगल के आस-पास की आवायियों में भी रात में इसका हमरा होना रहता है। दिन के प्रायः सभी जंगली स्थानों में पायी जाने के कारण लोग इसको बिल-बिलार या जमनी बिल्ली कहते हैं जो ठीक भी है।



बिलार

बिलार हमारी पालतू बिल्लियों के बराबर लगभग दो फुट लम्बा और एक फुट से कुछ ऊँचा होता है। इसकी दुम भी लगभग दस इंच की रहती है। इसके शरीर का रंग लालछाँह सिलेटी रहता है जिसमें कुछ भूरापन मिला रहता है। पीठ पर से दोनों बगल धुमेली लकी धारियाँ पड़ी रहती हैं, जो कभी-कभी टूटकर चित्तियों की शक्ल की हो जाती हैं। ज्यादा उम्र हो जाने पर इसके बदन की चित्तियाँ धुमेली और अस्पष्ट हो जाती हैं। इसके शरीर का निचला हिस्सा सफेद रहता है। लेकिन सीने पर कभी-कभी एक काली धारी पड़ी रहती है। कभी कभी पेट पर भी हल्के रंग की चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। इसके पैर के सल्ले लालछाँह होते हैं और दुम के निचले आधे भाग में छल्ले पड़े रहते हैं। दुम का सिरा हमेशा काला रहता है।

बिलार बहुत दृष्ट और डीठ जानवर है जो रात में वस्तिषा में घुमकर हमारा बहुत नुखसान करता है। इससे पालतू पक्षी और छोटे जानवरों को बचाना कठिन हो जाता है। यदि कोई पालतू जीव खुला रह गया तो इसके पहुँचने में डर नहीं लगती। दिन में यह किसी मुनसान खंडहर घास के मैदान या जंगल के किंगी बिल या खोह में छिपा रहता है लेकिन रात होने ही इसका शिकार शुरू हो जाता है।

इसकी मादा साल में दो बार तीन-चार बच्चे देती है।


विल्ली

(CAT)

विल्ली से भला ऐसा कौन है जो परिचित न होगा। हमारे घरों में दूध दही के लिए इसका फेरा लगता रहता है। कुछ शौकीन लोग इसे कुत्ते की तरह शौक के लिए भी पालते हैं और इसी कारण इसकी अनेक जातियाँ बन गयी हैं जिनमें ईरानी (Persian) और श्यामी मुख्य हैं।

हमारे देश में विल्लियों की किसी खास जाति का विकास नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं ईरानी और श्यामी की दोगली जातियाँ यहाँ फैली हुई हैं जो सफेद, भूरी, कलछींह या चितकवरी रहती हैं। इनमें से कुछ के बाल ईरानी विल्लियों की तरह बड़े भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या उन्हीं की है जो छोटे बालोंवाली होती हैं।

इन दोगली पालतू विल्लियों के अलावा एक देशी विल्ली हमारे यहाँ प्रायः सभी जगह पायी जाती है जो हमारे घरों में अक्सर दिखाई पड़ती है। इसी को हम यहाँ की घरेलू विल्ली कह सकते हैं, यद्यपि यह हमारे घरों में रहकर भी इतनी पालतू नहीं हुई है कि हम उसे पकड़ सकें। यह हमारे घरों में जरूर रहती है और वहीं बच्चे भी देती है, लेकिन हमारा नुकसान करने के कारण हम इसे मारने की ही घात में रहते हैं और वह भी हमें देखकर दूर भागने की ताक में चौकन्नी ही रहती है।



विल्ली

हमारे यहाँ की इस देशी विल्ली का रंग कलछींह सिलेटी रहता है जिसके सारे शरीर पर काली-काली चित्तियाँ, बिन्दियाँ और धारियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी टुम भी

वाली, गडारिया से भरी रहती है और आँध के पाम में माल तक दोना आर एक-एक वाली रेखा रहती है। यह रंग रूप में जगती विन्धिया म बहुत कुछ मिलती-जुलती हानो है और इसका उत्पात भी उनमे कम नही होता।

इस हमारे घर के दूध-दही की आदत जम्बर पड़ गयी है लेकिन यह वास्तव में मास भरी जीव है जो हमारे घर के छाने पालतू जीवा और मुर्गी, बभूतर बतस तथा अन्य छोटी चिड़िया पर हमला करती है। यह बड़ी भालाक होती है और चिड़िया के पिंजरा तब में हाथ डालकर उसे पकड़ लेती है। इसमें हमारा इतना लाभ जहर होता है कि यह हमारे घर के सूहा की भी सफाई करती रहती है।

यह एक बार में कई बच्चे देती है जिन्हें यह पाडे-थोडे दिन पर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर रखती है।

स्याहगोश

(CARACAL)

स्याहगोश को उसने काले कानों के कारण यह नाम मिला है। यह दिल्ली की शकल-मूरत का छोटा सा जानवर है जो अपने ऐंठे हुए काले कानों के कारण बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है।



स्याहगोश

स्याहगोश हमारे यहाँ पंजाब और मध्यप्रदेश के जंगलों में पाये जाते हैं। दक्षिण

की ओर भी ये मालावार तट को छोड़कर वहाँ के प्रायः सभी जंगलों में देखे जाते हैं। हमारे देश के इतने विस्तृत भाग में फैले रहने पर भी स्याहगोश इतनी कम संख्या में हैं कि इन्हें हम बहुत कम देख पाते हैं। इसके अलावा ये अपने रहने का स्थान भी ऐसे घने जंगलों के बीच में चुनते हैं कि वहाँ तक लोगों का पहुँचना कठिन होता है।

स्याहगोश करीब ढाई फुट लम्बा और डेढ़ फुट ऊँचा जानवर है जिसकी दुम एक फुट से कुछ कम ही रहती है। कुछ स्याहगोश हलके भूरे या बादामी रंग के होते हैं और कुछ के रंग में पीलेपन की झलक रहती है। इनके पेट का रंग पिलछोंह रहता है, लेकिन कुछ सफेद पेटवाले स्याहगोश भी पाये गये हैं। इनके पेट पर हलकी ललछोंह चितियाँ रहती हैं जो लिपीपुती-सी जान पड़ती हैं। टाँगों का भीतरी हिस्सा भी धुमैली चितियों से भरा रहता है। दुम का सिरा काला रहता है।

स्याहगोश और स्थानों की अपेक्षा मध्य भारत के जंगलों में अधिक संख्या में पाये जाते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे जानवर और मोर आदि पक्षी हैं। यही नहीं, ये कभी-कभी छोटे हिरनों को भी मार लेते हैं। चिड़ियों को पकड़ने में तो ये उस्ताद होते हैं। ये पेड़ों पर घूम-घूमकर चिड़ियों को तो पकड़ते ही हैं, जमीन पर भी इन्हें चिड़ियों के पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती क्योंकि ये जमीन से पाँच-छः फुट तक कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इनकी इसी फुर्ती के कारण कुछ लोग इन्हें शिकार के लिए पालते हैं और इनसे खरगोश, लोमड़ियों के अलावा मोर, कबूतर और तीतर आदि चिड़ियों का शिकार कराते हैं।

इनकी मादा एक बार में तीन-चार बच्चे देती है।

चीता

(CHEETA)

चीता हमारे देश का ही क्यों, सारे संसार का सबसे तेज दौड़नेवाला स्तनप्राणी है, लेकिन सिंह की तरह यह भी हमारे देश से अब धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। अफ्रीका में सिंहों की तरह चीते भी काफी संख्या में पाये जाते हैं, जहाँ से शीकीन लोग इन्हें पालने के लिए मँगाते हैं और इनके द्वारा हिरन आदि का शिकार करते हैं। ये वैसे तो तेंदुए के निकट सम्बन्धी हैं और इनका रंगरूप भी उनसे मिलता-जुलता रहता है लेकिन ये अपने पतले पैर, छोटे सिर और छरहरे बदन के कारण शरीर की बनावट में तेंदुए से एकदम अलग रहते हैं।

हमारे देश में चीता मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, राजपूताना और पंजाब के जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन अब इसकी सख्या इतनी कम हो गयी है कि यह बहुत मुश्किल से हमारी निगाह तले पड़ता है। जिस प्रकार सिंहों के कम हो जाने में उनका स्थान बाघों ने ले लिया है उसी प्रकार चीतों की कमी से हमारे जंगलों में तेंदुओं की सख्या काफी हो गयी है।



चीता

चीता लगभग साढ़े चार फुट लम्बा और ढाई फुट ऊँचा छरहरे बदन का जानवर है जिसके करीब ढाई फुट की लम्बी दुम होती है। इसकी टोंगें लम्बी, मिर छोटा और दुम मिर के पास कुछ घूमी-भी रहती है। इसके शरीर का रंग कभी ललछौह बादामी और कभी भूरापन लिये पिलछौह रहता है जिसपर काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। नौके का रंग ऊपर से बहुत हलका हाता है, लेकिन काली चित्तियाँ उस पर भी उनी प्रकार रहती हैं। टुड्डों और गले का रंग सफेदी-भायल रहता है और बड़ी चित्तियाँ नहीं हातो। दुम पर भी काले चित्ते रहते हैं जो जड़ के पास छला की दाबल के हो जाते हैं। दुम का मिरा हमेशा सफेद रहता है।

चीने के बदन की चित्तियाँ गुलदार के बदन के गुलों की तरह बीच में गाली नहीं रहती, बल्कि वे काली और गाल बिदिया की दाबल की होती हैं। इन्हीं बाल चित्ता के कारण इसे चित्ता या चीता कहा जाना है। इससे बदन पर के बाल घंसे ता छाटे और बड़े होते हैं, लेकिन गरदन पर के बाल लम्बे और बिखरे बिखरे-ने रहते हैं। बन्ना के शरीर के बाह्र बड़े होते हैं जिनसे उनसे बदन की चित्तियाँ ढक्-भी जाती हैं।

चीते को अब भी लोग शिकार के लिए पालते हैं और इससे हिरन आदि का शिकार खेलेते हैं। इसकी आँख पर पट्टी बाँधकर किसी बैलगाड़ी द्वारा उस स्थान पर ले जाया जाता है, जहाँ हिरनों के मिलने की आशा रहती है। वहाँ हिरनों का गरोह दिखाई पड़ने पर इसकी आँख की पट्टी खोल दी जाती है और यह उन्हें देखते ही उनके पीछे दौड़ पड़ता है। यह उनके पास पहुँचकर किसी एक को पंजा मारकर गिरा देता है और तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक इसका मालिक वहाँ नहीं पहुँच जाता। शिकारी हिरन के पास पहुँचकर उसकी गरदन काट देता है और चीते को उसका खून किसी बरतन में भरकर दे देता है। चीता जब खून पीने लगता है तो उसकी आँखों पर फिर पट्टी चढ़ा दी जाती है और उसको जंजीरों में बाँध लिया जाता है।

इसकी मादा तेंदुए की तरह कई बच्चे देती है। इसकी और आदतें तेंदुए से मिलती-जुलती रहती हैं।

कस्तूरी-परिवार

(FAMILY VIVERRIDAE)

इस परिवार में पहले से कम जीव हैं जो मझोले कद के और कुछ उससे भी छोटे होते हैं। इन जीवों का मुँह बिल्ली परिवार के जीवों की तरह गोल न होकर कुत्तों की तरह लम्बा होता है। इनके पैर भी छोटे होते हैं।

ये सब जीव मांसाहारी होते हैं और पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ लेते हैं।

इस परिवार के जीवों में आपस में काफी भेद होने के कारण उन्हें तीन उपपरिवारों में बाँटा गया है—

१. कस्तूरी उपपरिवार—Sub Family Viverrinae

२. मुसंग उपपरिवार—Sub Family Paradoxurinae

३. न्योला उपपरिवार—Sub Family Mungotinae

कस्तूरी उपपरिवार के प्राणियों का कद लगभग बिल्लियों के बराबर होता है। इनके शरीर पर गाढ़े चित्ते रहते हैं और दुम के नीचे एक ग्रन्थि रहती है जिसमें से एक प्रकार का गन्धपूर्ण गाढ़ा पदार्थ निकलता है।

इन प्राणियों की जीभ खुरखुरी होती है और इनके कुछ नाखून बिल्लियों की तरह भीतर की ओर घुसे रहते हैं। इनमें से कस्तूरी हमारे यहाँ का प्रसिद्ध जीव है।

मुमग उपपरिवार में बम्बूरी में मिलन-जुगन जीव है जो पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ लेने है। यहाँ तक कि ताड़ और गजूर के पेड़ा पर चढ़ना भी इसके लिए मामूली बात है। इनके पैरों की उँगलियाँ आपस में एक प्रकार की चिल्ली में जुड़ी रहती हैं और इनके नाखून पंजों के भीतर खोड़ा ही घुम सकते हैं। इनमें मुमग या ताड़ को चिल्ली हमारे यहाँ का प्रसिद्ध जीव है।

तोषरा उपपरिवार गायों का है जिसमें गायों जैसा ही जीव है। यह इस वर्ग का सबसे छोटा प्राणी है लेकिन माहम में आयद यह समझे आगे है। अपनी खान पीने की आदत के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह अपने पिक्कार का गन्ना कान्तर खूब खा पी ही लेता है साथ ही साथ उमरा भोज भी खा लेता है। गान्तर दोर हाने हुए यह फल बगैर भी बड़े भजे में खा लेता है।

नीच इस परिवार के प्रसिद्ध जावा का संक्षेप में वर्णन दिया जा रहा है।

बटास

(LARGE INDIAN CIVET)

बटास बम्बूरी का ही भाई विरादरी है जो हमारे देश में केवल पूर्वी हिस्सा में पाया जाता है। यह नेपाल में उड़ीगा तक और उसके पूर्व के जंगल में पाया जाता है और रात्रिभर हाने के कारण हमारी निगाह-संज्ञे बहुत कम पड़ता है।



बटास

के दोनो ओर धारियाँ और चित्तियाँ पड़ी रहती हैं लेकिन बाधों में ज्यादा धुम मचाने ही रहती है। इसकी टाँगों की जड़ के पास का हिस्सा मिट्टी जैसा काली धारियों से भरा रहता है। इसके सीने पर भी चौड़ी काली धारियाँ पड़ी रहती हैं।

कदाचित्त दिन भर जंगल में किसी घनी छाड़ी में छिपा रहता है और रात होने पर

इसका बंद बाई फुट में कुछ बगैर हाता है जिसके लगभग डेढ़ फुट लम्बी मोटा घुम रही है। इसका रंग गाढ़ा मिट्टी होता है और पीठ पर बाल काट रहने हैं। बदन




बाहर निकलता है। यह अक्सर अकेला ही रहकर शिकार करता है और जंगल के पास की आवायियों में भी चला जाता है। इसका मुख्य भोजन छोटे-मोटे जानवर और चिड़ियाँ हैं। इसके अलावा यह मेढक, मछली, जड़ और फल-फूल भी खाता है।

कदास तैरने में भी बहुत उस्ताद होता है और कस्तूरी की तरह इसकी दुम के नीचे भी एक गन्ध-धैली रहती है जिससे एक प्रकार का गन्धपूर्ण पदार्थ निकला करता है। इसकी मादा एक बार में तीन से पाँच तक बच्चे देती है।

कस्तूरी

(SMALL INDIAN CIVET)

कस्तूरी लोमड़ी और विल्ली के बीच का जानवर है जिसका मुँह लोमड़ी की तरह और शरीर विल्लियों की तरह रहता है। यह हमारे देश में प्रायः सभी जगह पायी जाती है और इसी कारण इसे कहीं चोंधियारी, कहीं सोनहार और कहीं कस्तूरी कहते हैं। बंगाल में इसे गन्धगोकुल कहा जाता है और कहीं यह मुस्क-विल्ली कहलाती है।



कस्तूरी

कस्तूरी को यह नाम इसलिए मिला है कि इसकी दुम के नीचे एक गन्ध-धैली रहती है जिसमें से एक प्रकार का तेज बू-वाला गाढ़ा पदार्थ निकला करता है। मुस्क बेचने-वाले अक्सर इस को कस्तूरी या मुस्क में मिलाकर बेच देते हैं।

कस्तूरी हमारे यहाँ सारे देश में फैली हुई है। रात्रिचर जीव होने के कारण यह हमारी निगाह तले बहुत कम पड़ती है लेकिन जिसने भी पालतू पशु-पक्षी पाल रखे

है वह इनके उपद्रव को भली-भाँति जानता है। यह पालतू जीवों के लिए बिल्ली और लोमड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है।

बस्तूरी का वद लगभग दो फुट लम्बा होता है जिसके करीब डेढ़ फुट लम्बी दुम रहती है। इसके वदन का रंग भूरापन लिये सिलेटी रहता है जिसपर काली-काली चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। पीठ की चित्तियाँ लम्बी होकर पक्षियों का रूप धारण कर लेती हैं लेकिन शरीर की अन्य चित्तियाँ ब्रे-सिलसिले रहती हैं। सारी दुम काली गड़ारियों से भरी रहती है लेकिन इसके पेट पर किसी किस्म की चित्तियाँ नहीं रहती। इसके दोनों कानों के पास से कंधे तक दोनों ओर एक-एक काली लकीर रहती है और गरदन के ऊपर भी कुछ खड़ी धारियाँ पड़ी रहती हैं।

ये दिन भर किसी घनी छाड़ी या ऐसे बिलों में घुसी रहती है जो प्रायः जलाशयों के आस-पास रहते हैं। इसके अलावा ये खंडहरों और बीरान मकानों में भी दिन में घुसी रहती है और सारा दिन ऐसे ही सुनसान स्थानों में बिताकर रात को शिकार के लिए बाहर निकलती है। इनका मुख्य भोजन छोटे-छोटे जानवर, चिड़ियाँ, अण्डे, भेड़, साँप और कीड़े-मकोड़े हैं। इसके अलावा ये फल फूल भी बड़े स्वाद से खाती है और पालतू पशु-पक्षियों की तो ये जानी दुश्मन हैं।

कस्तूरी बड़ी आसानी से पालतू हो जाती है और अक्सर घिकारी लोग इसे स्याह-गोश की तरह शिकार कराने के लिए पालते हैं। इसकी मादा एक बार में चार-पाँच बच्चे देती है।


मुसग

(INDIAN PALM CIVET)

मुसग का वही-कही ताड़ की बिल्ली भी कहते हैं। ये बस्तूरी की शक्ल मूलतः की होती है लेकिन इनके वदन का रंग उसमें कुछ भिन्न रहता है। बस्तूरी की तरह ये भी हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में फैली हुई है जो अपना ज्यादा समय पेड़ों पर ही बिताती है। पेड़ों में भी ये ताड़, खजूर और नारियल ज्यादा पसन्द करती है, जहाँ इन्हे अक्सर शाम को देखा जा सकता है।

मुसग लगभग डेढ़-दो फुट लम्बी होती है जिसकी दुम भी करीब-करीब इतनी ही लम्बी हो जाती है। इसके वदन का रंग भूरापन लिये सिलेटी रहता है जिस पर काली

चित्तियाँ और धारियाँ पड़ी रहती हैं। इसके पैर गहरे रंग के होते हैं और सिर के ऊपरी हिस्से से नाक के बीच तक एक गहरी धारी पड़ी रहती है।



मुसंग

मुसंग से हम सभी बहुत परिचित हैं। ये प्रायः वस्तियों के आसपास की झाड़ियों और खाली मकानों में रहती हैं। ये भी रात्रिचर हैं जो दिन भर वीरान जगहों में रहकर शाम होते ही बाहर निकलती हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद होती हैं और इनसे भी वस्तियों की पालतू चिड़ियों और छोटे जानवरों को बहुत खतरा रहता है। ये छोटे जानवरों और चिड़ियों के अलावा कीड़े-मकोड़े और फल-फूल भी खाती हैं और ताड़ और खजूर के पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी का बहुत नुकसान करती हैं।

कस्तूरी की तरह यह भी आसानी से पालतू हो जाती है और इसके भी दुम के नीचे गन्ध की थैली रहती है। इसकी आदतें बहुत कुछ कस्तूरी से मिलती-जुलती होती हैं। मुसंग की मादा एक बार में चार-पाँच बच्चे देती है।

नेवला

(MANGOSE)

नेवला हमारा इतना परिचित जीव है कि इसे हम सबने अपने घर के आस-पास घूमते देखा होगा।

यह हमारे देश के प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। नेबला बरीब फूट, गन्ना फूट लम्बा होता है जिसके इतनी ही लम्बी दुम रहती है। इसका रंग भूरा होता है जिसमें कुछ पिन्डछोह और स्याहीपन की मल्ल रहती है। कुछ के शरीर में एक प्रकार की लट्ठाई भी रहती है। इसके बदन पर छोटे और गुरगुरे बाल रहते हैं जिन्हें यह हमला करने समय फुलाकर साहों के काँटों की तरह नट्टे कर लेता है और तब इसकी आँखें



नेबला

दूनी दिशाई पड़ने लगती है। इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं।

नेबले दिन और रात दोनों समय बाहर दिशाई पड़ते हैं। बैसे तो ये बिल बना कर रहते हैं। लेकिन पेड़ों पर चढ़ने में भी ये किसी से पीछे नहीं रहते।

ये बहुत अचलमान्द और चालाक जानवर हैं जो साहस में किसी से कम नहीं होते। ये अपने में धींगुने जानवर पर हमला कर बैठते हैं और उनकी गरदन काटकर उनका खून चूस लेते हैं। इनका मुख्य भोजन बैसे तो मांस है, लेकिन ये फल भी खूब मजे में खाते हैं। इनमें कीड़े-मकोड़े, छोटे-छोटे जानवर, चिड़ियाँ और मरीमूष और उनके अण्डे बचने नहीं पाते। साँप के तो ये जानी दुश्मन हैं और उन्हें इस फुर्ती में मारते हैं कि देखकर ताग्नूब होता है। जहरीले में जहरीले साँपों की गरदन पर ये पीछे से बड़ी तेजी से सपटते हैं और उनकी गरदन काट डालते हैं। इनमें पालतू चिड़ियों को बहुत खतरा रहता है, लेकिन एक तरह से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं क्योंकि ये घूँटों और साँपों को मारकर हमारा उपकार ही करते हैं।

लकड़बघा-परिवार

(FAMILY HYAENIDAE)

लकड़बघा अपने परिवार का अकेला प्राणी है जिसका अगला हिस्सा तो बड़ा और रोबीला होता है, लेकिन पीछे का हिस्सा पतला और कमजोर रहता है। इसके लिए एक अलग परिवार इसी कारण बनाना पड़ा है कि यह न तो बिल्ली-परिवार के

प्राणियों ने मिलना है और न कस्तूरी-पन्धियार के प्राणियों में। इनकी गोपनी बड़ी और इसके दांत लम्बे और बहुत मजबूत होते हैं।

इन जीवों के पंजों में पाँच की जगह चार ही उँगलियाँ रहती हैं और उनमें के लम्बे छोटे और भोकरे होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती में कोई कमर नहीं रहती। इनको देखकर ऐसा लगता है कि वे मिट्टी खोदने के लिए ही बनाये गये हैं। ये लम्बे बिल्लियों की तरह पंजे के भीतर नहीं समा सकते। इनकी भी जवान काफी प्यारी होती है। ये मुर्दाखोर जीव हैं।

नीचे अपने यहाँ के प्रसिद्ध लकड़बघे का वर्णन दिया जा रहा है।

लकड़बघा

(STRIPED HYAENA)


लकड़बघा हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध और परिचित जीव है जो हमारे देश के प्रायः सभी जंगलों में पाया जाता है। जंगलों के अलावा यह हमारे यहाँ के ऊबड़-खाबड़ भौटों, नालों और कछारों के आस-पास भी बिलों में रहता है। यह मुर्दाखोर जानवर है जो प्रायः मरे हुए ढोरों और शेर आदि शिकारी जानवरों के मारे हुए शिकार से अपना पेट भरता है। इसकी हाड़ चबाने की आदत से इसे हड्डा भी कहते हैं।

लकड़बघा बहुत ही बेडौल और बदमूरत जानवर है जिसके आगे का हिस्सा तगड़ा और पीछे का कमजोर और दुबला होता है। इसके पंजों में अग्रे मांसभक्षी जीवों की तरह पाँच उँगलियाँ न होकर केवल चार ही उँगलियाँ रहती हैं।

लकड़बघा करीब साढ़े तीन फुट लम्बा जानवर है जिसकी शकल-सूरत बिल्ली की तरह न होकर कुत्ते-जैसी होती है। इसकी दुम की लम्बाई भी लगभग डेढ़ फुट रहती है जिस पर काफी बाल रहते हैं। आगे का हिस्सा भारी और उठा-उठा-सा रहता है और अगले पैर भी पिछले पैरों से बड़े रहते हैं। इससे यह सामने से बड़ा रोबीला जान पड़ता है। इसकी पीठ और गरदन पर काफी बड़े बाल होते हैं और पूँछ भी काफी बड़ी होती है।

लकड़बघे का रंग पिलछींह सिलेटी या राखी रहता है जिस पर खड़ी और आड़ी कलछींह धारियाँ पड़ी रहती हैं। अपने शरीर के सफेद और काले रंग की मिलावट से यह कर्छे रंग का दिखाई पड़ता है।

सहडव्या देगने में डगमगा जरूर लगता है, लेकिन यह बहुत दूरपो है। इसमें न तो तेंदुए की-सी तेजी रहती है और न शेर-या गाहम। यह जानवरा के भाग में अपना पेट भरता है, लेकिन कभी कभी बग्निया में जा पायू मुगगिया और बग्निया को भी पायता है। यही नहीं, यह आदमिया के छेवा भी मोठा पातर उड़ा ले जाता है।



सहडव्या

गिद्ध का जा स्थान चिट्टियों में है वही स्थान इस स्तनप्राणियों के समाज में मिला है। इसी में इन लोग जानवरा का मेहतर बहने हैं और इस प्रकार यह जंगल की सफाई का आवश्यक काम करता रहता है।

इसकी मादा एक बार में चार-पाँच बच्चे देती है।

लकडबघे की एक और जाति हामी है जिसका बदन चित्तीदार रहता है। इस जाति के चित्तीदार लकडबघे (Spotted Hyena) अफ्रीका के जंगल में पाये जाते हैं।

कुत्ता-समूह

(SECTION CYNODEA)

कुत्ता-समूह में केवल एक ही परिवार है जिसे कुत्ता-परिवार कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के पालतू और जंगली कुत्ते, भेड़ियों और लोमड़ियों आदिको एकत्र किया गया है।

कुत्ता-परिवार

(FAMILY CANIDAE)

इस परिवार में, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, कुत्ते, भेड़िये और उनके निकट सम्बन्धी जीव रखे गये हैं जिनकी टांगें, दुम और थूथन प्रायः लम्बे होते हैं ।

विल्ली-परिवार के प्राणियों की तरह ये हमेशा शिकार करके ही अपना पेट नहीं भरते बल्कि दूसरे के मारे हुए शिकार से भी अपना पेट भर लिया करते हैं । ये मांस के अलावा और चीजें भी खाते हैं । स्यार जहाँ फूट और ककड़ी तक ही मजे में खाता है वहीं कुत्ते से कुछ भी खाने से नहीं छूटता ।

इन जानवरों के कुकुरदन्त बड़े और तेज होते हैं, लेकिन इनके नाखून विल्लियों के नाखूनों की तरह भीतर नहीं समा सकते । इसी कारण ये उतने तेज न रहकर भोथरे हो जाते हैं । इनकी जीभ विल्ली-परिवार के जानवरों के बराबर खुरखुरी नहीं होती ।

ये सब थूथचारी जीव हैं जो प्रायः गोल बनाकर रहते हैं । इनकी सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और इनके तलवे विल्लियों की तरह मुलायम रहते हैं ।

ये सब अपनी चालाकी और अक्लमंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं । लोमड़ी की मक्कारी, स्यार की चालाकी, भेड़िये का छल-कपट और कुत्ते की अक्लमंदी के बारे में हम सब जानते ही हैं ।


यहाँ इस परिवार के कुछ प्रसिद्ध जीवों का वर्णन दिया जा रहा है ।

कुत्ता

(DOG)

बोड़े की तरह कुत्ते भी मनुष्यों के पुराने साथी हैं जिनका मनुष्य की सभ्यता में बहुत बड़ा हाथ है । आज संसार में पालतू कुत्तों की करीब दो सौ जातियाँ पायी जाती हैं । लेकिन हमारे देश में अभी तक कोई ऐसी जाति नहीं जिसे हम अपने देश की जाति कह सकें । विदेशों में तो अलशेशियन (Alsatian), स्पैनियल (Spanial), बुलटेरियर (Bull-terrier), सेटर (Setter), फाक्सटेरियर (Fox-terrier), गोल्डेन रिट्रीवर (Golden-Retriever), ब्लडहाउण्ड (Blood-Hound) ग्रेहाउण्ड (Grey-hound), डलमेशियन (Dalmatian), डाक्सहंड (Dachs-hund), पेकिनीज़

(Pekinese) आदि प्रसिद्ध जानियाँ हैं, लेकिन हमारे देश में उन्ही कुत्तों की मह्यता अधिक है जो देश भर में गाँव और वस्तिषो में अगारा घूमा करते हैं। इनकी शकल-भूरत और रंग अलग-अलग होते हैं और ये अक्सर इन्ही विदेशी कुत्तों के दोगले बनने होते हैं जिन्हें शीशिन लोग पाले हुए हैं।



कुत्ता

ये देशी कुत्ते किम जगली जानि से पालतू किये गये, इसका अभी ठीक-ठीक पता नहीं चला है। लेकिन ऐसा ख्याल किया जाता है कि हमारे यहाँ के देशी कुत्ते मोनहा नामके जगली कुत्ते से पालतू किये गये हैं। इन

कुत्तों के बदन और रंग में तो फर्क रहता ही है, इनकी शकल-भूरत भी मुखालिक होती है। इनका कद स्यारो के बराबर होता है और बदन के बाल बहुत छोटे होते हैं। इनमें कुछ सफेद होते हैं तो कुछ ललछीह, भूरे या बावामी। कुछ का रंग काला होता है तो कुछ चिनकवरे रहते हैं। ये स्यारके निकट सम्बन्धी हैं और एक प्रकार से ठमी नस्ल के माने जाते हैं। इन्हें पालतू अवस्था में भी स्यारो से जोड़ा बाँधते देखा गया है। और आज भी मैकडो कुत्ते ऐसे मिल जायेंगे जिनकी शकल-भूरत स्यारो से मिलनी-जुलनी होती है।

पहले तो सभी कुत्ते जगली अवस्था में थे लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी मह्यता पालतू होकर हमारे साथ रहने लगी है। इनका सम्बन्ध अपने पूर्वजों से लाखों वर्षों से छूट गया है, लेकिन यह बात बड़े आश्चर्य की है कि यदि कुत्ते मनुष्यों से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हैं तो वे फिर जगली हो जाते हैं। तब उनमें और परिवर्तनों के अलावा एक परिवर्तन यह भी हो जाता है कि वे कुत्तों की तरह भूँकना मूलकर स्यार तथा भेड़ियों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं।

कुत्तों की स्वामिभक्ति, उनका प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता की अनेक कथाएँ हैं। मनुष्यों के साथ एक युग से रहने-रहने इन्होंने अपना इतना विकास कर लिया है कि कभी-कभी इनके कार्यों को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। अपने मालिक की

कादारी में ये अपनी जान भले ही गवा दें, लेकिन कभी भागने का नाम नहीं लेते। प्रेम और मुहब्बत तो इनमें इस कदर होती है कि मालिक के मरने पर अवसर देखा गया है कि पालतू कुत्तों ने खाना-पीना छोड़ दिया और मर गये।

कुत्ते संगीत के बड़े प्रेमी होते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि जब मन्दिरों में घण्टा, घड़ियाल बजने लगते हैं तो पास-पड़ोस के कुत्ते भी एक स्वर से बोलने लगते हैं। उनकी इस बोली को हम उनका रोना कहते हैं क्योंकि वह भूंकने से एकदम जुदा होती है, पर वास्तव में यह कुत्तों का रोना नहीं है। पशुशास्त्र के विद्वानों ने बड़ी गंज और अनुसंधान के बाद यह पता लगाया है कि कुत्तों में संगीत-प्रेम की एक अद्भुत प्रेरणा होती है और कुछ कुत्ते इसीलिए संगीत या वाद्य के अवसर पर उस स्वर में अपना स्वर मिलाने का उद्योग करते हैं। विदेशों में तो कुत्तों के वाका-फा स्कूल हैं जहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती है। पुलिस-विभाग में इनसे काफी काम लिया जाता है और लड़ाई के मैदानों में भी ये डाकिये का काम बड़ी सफलता से करते हैं। घर की रखवाली और चौकीदारी करना तो इनका स्वाभाविक काम है और इसी के लिए मनुष्यों ने इनको अपना साथी बनाया है।

इनका मुख्य भोजन मांस है, लेकिन मनुष्यों के साथ रहते-रहते इन्होंने पका हुआ भोजन करना भी सीख लिया है। इनकी मादा एक बार में कई बच्चे जनती है जिनकी आँखें पैदा होने पर बन्द रहती हैं और उनके खुलने में दस-बारह दिन लग जाते हैं।

भेड़िया

(WOLF)

भेड़िया हमारे यहाँ का बहुत मशहूर शिकारी जानवर है जो शकल-सूरत में कुत्ते से मिलता-जुलता होता है। जर्मनी के अलशेशियन (Alsatian) जाति के कुत्ते जो शकल-सूरत में भेड़िये जैसे ही होते हैं। भेड़िये खुले मैदान में रहनेवाले जीव हैं जिन्हें घने जंगल पसन्द नहीं। हमारे यहाँ ये हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं। विन्ध्य प्रदेश के पठारों पर भी ये काफी संख्या में पाये जाते हैं, लेकिन हिमालय की ओर इन्हें नहीं देखा जा सकता।

भेड़िये को कहीं-कहीं वीग या विगवा भी कहते हैं और कहीं-कहीं ये गुर्र के नाम

से भी पुकारे जाते हैं। ये अपनी चालाकी और गोलबन्दी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये छल और चोरी में बहुत ही माहिर होते हैं, और हमेशा अपने शिकार को धोखा देकर मारते हैं। इनमें बहादुरी नहीं होती लेकिन चालाकी की तरकीबें इन्हें खूब आती हैं। अगर किसी बड़े शिकार को यह अकेले या दो-चार मिलकर नहीं मार पाते तो उसे घेरकर ऐसी जगह फँसा देते हैं जहाँ पहले से कुछ भेड़िये छिपे रहते हैं। इसी तरह जब ये भेड़ या बकरियों के झुंड पर हमला करते हैं तो उनमें से कुछ तो खबाली के कुत्ता से लड़कर उन्हें उलझाये रहते हैं और कुछ भेड़ों को उठा ले जाते हैं।



भेड़िया

भेड़िये लम्बाई में लगभग तीन फुट के और ऊँचाई में दो-ढाई फुट के होते हैं। इनकी दुम भी डेढ़ फुट की होती है जिसका रंग राखी भूरा रहता है। इनकी पीठ का रंग स्याही मायल और पेट का हिंसा मटमैला सफेद होता है।

इनके बच्चे बलछौह भूरे रंग के होते हैं, जिनके सीने पर एक सफेद चिह्न पड़ा रहता है जो महीने डेढ़ महीने में गायब हो जाता है।

भेड़िये पैस तो जोड़े में रहनेवाले जीव हैं, लेकिन कभी कभी ये सात-आठ वा गोल बनाकर चलते हैं। ये बहुत चालाक जानवर हैं जो भूखे रहने पर बहुत सूँघार हो जाते हैं। हमारे देश में ये अक्सर आदिमियों के बच्चों को भी उठा ले जाते हैं।

भेड़ियों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि ये कभी-कभी आदमियों के बच्चों को पालने के लिए ले जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे इनकी माँद में पाये भी गये हैं। लेकिन अभी इसका कुछ ठीक पता नहीं चल सका है और जो बच्चे इनकी माँद से मिले भी वे ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सके और जो जिन्दा बच्चे भी वे आधे हैवान-से हो गये और बोल्ना नहीं जानते। इससे यह विषय अभी तक रहस्यपूर्ण बना हुआ है।

भेड़िया मांसाहारी जीव है जिसकी खूराक में हर किस्म के जानवरों को शामिल किया जा सकता है। वैसे ये खरगोश, लोमड़ी और भेड़-बकरी का शिकार करते हैं, लेकिन भूखे रहने पर चार-पाँच भेड़िये मिलकर गाय-बैल पर भी हमला कर बैठते हैं। कभी-कभी ये आदमियों पर भी आक्रमण करते हैं और एक बार आदमखोर हो जानेपर ये शेर और चीते से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जिस गाँव या वस्ती के आस-पास के भेड़िये आदमखोर हो जाते हैं वहाँ के बच्चों को इनसे बहुत डर रहता है क्योंकि ये अक्सर सात-आठ फुट ऊँची दीवाल फाँदकर घर के भीतर से बच्चों को उठा ले जाते हैं।

इनकी मादा जाड़ों में पाँच-सात बच्चे जनती है जिनकी आँखें कुत्ते के पिल्लों की तरह शुद्ध में बंद रहती हैं।

स्यार

(JACKAL)

स्यार को गीदड़ भी कहा जाता है। ये हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं। क्या जंगल, क्या मैदान कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इनकी पहुँच न हो। देहात में इन्हें देखना मामूली बात है। ये पहाड़ी स्थानों और खुले मैदानों में तो मिलते ही हैं, लेकिन अपनी दिठाई के कारण ये आवादी के आस-पास भी अक्सर दिखाई पड़ते हैं। हिमालय पर ये तीन-चार हजार फुट से ज्यादा ऊँचाई पर नहीं जाते।

स्यार की धूर्तता की एक नहीं, अनेक कहानियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं। ये प्रायः जोड़े में दिखाई पड़ते हैं और इतने डीठ हो गये हैं कि हम इन्हें बहुत नजदीक से देख सकते हैं। ये वैसे तो अकेले या जोड़े में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी इन्हें गरोह में भी देखा जा सकता है। जाड़ों में शाम होते ही इनकी बोली सुन पड़ती

है। पहले एक स्यार बोलता है, फिर उसके बाद उसके साथी 'हुवा हुवा' हुवा हुवा ' ' जैसी वाली बोलकर इतना शोर मचाने हैं कि जी ऊब जाता है।



स्यार

स्यार ढाई फुट से कुछ ज्यादा लम्बा होता है जिसमें इसकी एक फुट की सवरीं दुम शामिल नहीं। इसका रंग भूरापन लिये ललछीह या कसई रहता है जिसमें पीठ पर कुछ स्याही रहती है। नीचे का हिस्सा बहुत हलका या सफेदी भायल रहता है। दुम के ऊपर के बाल खरे और मिर के वाले रहते हैं।

स्यार रात्रिचर जीव है जो रात को अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलता है लेकिन जाड़ा में हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। इसका मुख्य भोजन बैंगे तो मास-मछली है लेकिन यह फल बगैरह भी बड़े स्वाद से खाता है। तरबूज और खरबूजे के खेतों को इसमें बचाना मुश्किल हो जाता है और गाँव बस्ती की पालतू चिड़ियों और छोटे जानवरों का भी इससे कम खतरा नहीं रहता है। लकड़वाघे की तरह यह भी मुर्दाखोर जानवर है जो मुर्दा जानवरों के अलावा बीमार और रोगी जीवों पर हमला करता है।

इसकी मादा एक बार में कुत्ता की तरह कई बच्चे देती है।


सोनहा

(WILD DOG)

सोनहा हमारे यहाँ के जंगली कुत्ते हैं जिन्हें वही बोल और वही सोनाहुता कहा जाता है। ये हमारे देश में तराई से दक्षिण की ओर प्रायः सभी जंगलों में

पाये जाते हैं, लेकिन मंथ्या में कम होने के कारण ये हमें बहुत कम दिखाई पड़ते हैं।

सोनहा तीन फुट से कुछ ज्यादा ही लम्बे होते हैं जिनकी एक फुट के लगभग जवरी पूँछ होती है। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ललछाँह वादामी होता है जिसमें कुछ मिलेटीपन की मिलावट रहती है। इनके नीचे का हिस्सा हल्के रंग का और दुम का सिरा काला रहता है।



सोनहा

सोनहा झुंड में रहनेवाले जानवर हैं जिन्हें दिन, रात दोनों समय जंगलों में देखा जा सकता है। इनके गोल में बीस-पच्चीस सोनहे रहते हैं जो चालाकी में भेड़ियों और मक्कारी में स्यारों के कान काटते हैं। शिकार करते समय इनमें गजब का एका रहता है जिससे ये साँभर और रोझ जैसे जानवरों को घेरकर मार डालते हैं। जिस जंगल में इनका गरोह पहुँच जाता है वहाँ से हिरन वगैरह तो भाग ही जाते हैं; शेर और तेंदुओं का भी वहाँ पता नहीं चलता। इनके बारे में यह गलतफहमी फैली है कि ये अपनी दुम पर पेशाब करके शेर तक को अन्धा बना देते हैं, लेकिन इसमें सत्यता बहुत थोड़ी है। होता यह है कि किसी शिकार को घेरते समय ये आस-पास की झाड़ियों पर पेशाब कर देते हैं जो झाड़ियों से रगड़कर भागते हुए शिकार की आँखों में पड़ जाता है और वह थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सोनहा का गरोह उसे घेरकर मार डालता है।

इनका मुख्य भोजन मांस है, लेकिन ये स्यार की तरह फल वगैरह भी वड़े

चाव से खाने है। ये ज्यादातर शिकार मारकर ही अपना पेट भरते हैं और मियारा की तरह मुर्दाखोर नहीं होते।


इनकी मादा जनवरी से मार्च के बीच में पाच छ बच्चे देती है।

लामडी

(FOX)

लामडी हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जीवा म में है जो सारे पशु-ममाजमें सबसे चालाक मानी जाती है। इसकी चालाकी की मकड्डा कहानियाँ प्रचलित हैं। शिकारी कुत्तों को भागने भागते बनरी काटकर चकमा देना इसके बाये हाथ का खेल है। स्वार की तरह इसको भी हम अक्सर गाव के आस-पास देखते हैं और इससे उत्पात म भी गाववाला का परेशान हो जाना पड़ता है। पालतू पशु पक्षियों की यह जानी

दुस्मन है जिन्हें यह एसी चालाका में चुरा ले जाती है कि हमें पता भी नहीं लगन पाता। इसको देहात में लाखरी कहते हैं।



लामडी

लामडी की कई जातियाँ यहाँ पायी जाती हैं लेकिन इन सबम वही प्रसिद्ध है जिसका यहाँ वणन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ यह लामडी हिमालय की तराई मधुर दक्षिण तक फैली हुई है। इसे घन जंगल पसन्द नहीं है इसीलिए यह

ज्यादातर खुल मैदानों तितरे वितरे जंगलों और खता म घूमती रहती है।

यह लगभग डेढ़ फुट लम्बी होती है जिससे करीब करीब इतनी ही बड़ी माटी और सबरी दुम रहती है। इसका शरीर ललछीह सिन्टी रंग का रहता है जो नीचे सफेदी मायल हा जाता है। दुम भी सिन्टी रंग की होती है लेकिन उसका निरा वाला रहता है।

लामडी की बस्ती के आस-पास रहता ज्यादा पगद है। जाड़ा में हमें इसकी

बोली सुनाई पड़ती है जैसे कोई आदमी जोर से हँस रहा हो। यह विल में रहना तो पसन्द करती है, लेकिन विल खोदने का कष्ट उठाना नहीं चाहती। इसीलिए यह अक्सर विज्जू आदि जानवरों के विल पर जवर्दस्ती कब्जा कर लेती है और उसको कई मुँहवाला बनाकर उसी में रहने लगती है। यह इतनी चालाक होती है कि विल के मुँह पर किसी के पैर के निशान देखकर फिर वहाँ नहीं रहती और फौरन ही दूसरी जगह विल की तलाश करती है। कभी-कभी यह दुश्मनों को निकट देखकर इस प्रकार दम साधकर जमीन पर पड़ जाती है कि ठोकर मारने और इधर-उधर घसीटी जाने पर भी ऐसी बनी रहती है जैसे मर गयी हो, लेकिन दुश्मनों के चले जाने पर यह उठकर चम्पत हो जाती है।

इसका मुख्य भोजन वैसे तो मांस है, लेकिन यह फल-फूल और कंदमूल भी बड़े स्वाद से खाती है। इससे चिड़ियाँ छोटे-मोटे जानवर और सरीसृप तथा कीड़े-मकोड़े कुछ भी नहीं बचने पाते।

इसकी मादा अप्रैल के आस-पास तीन-चार बच्चे देती है।

भालू-समूह

(SECTION ARCTOIDEA)

मांसभक्षी वर्ग के इस तीसरे समूह में कई परिवारों को एकत्र किया गया है जिनमें के सभी प्राणियों के पैरों में पाँच-पाँच नाखून रहते हैं।

भालू-समूह को भालू-परिवार, बाघ-परिवार तथा ऊद-परिवार में बाँटा गया है जिसके जीव हमारे देश में पाये जाते हैं।

भालू-परिवार

(FAMILY URSIDAE)


इस परिवार में सब प्रकार के भालू रखे गये हैं जो मांसभक्षी होने के साथ ही साथ फल और अह्द भी मजे में खा लेते हैं। इन प्राणियों का सिर गोल और धुन लम्बा होता है। इनके पैर काफी तगड़े और नख बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन आँखें छोटी ही रहती हैं। चलते समय ये अपने पूरे तलुवे जमीन पर रखते हैं, लेकिन इनकी चाल बड़ी बेहंगी-सी होती है जैसे कोई लुट्का रहा हो। इनका कारण यह है कि चलते समय ये ऊँट की तरह अपने एक तरफ के दोनों पैरों को एक साथ ही उठाकर आगे रखते हैं। इनकी दुम छोटी होती है।

हमारे यहाँ तीन प्रकार के भालू पाये जाते हैं जिनका अलग-अलग वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

भूरा भालू

(BROWN BEAR)

भूरे भालू को इनके क बड़े रंग के कारण बड़ी-बड़ी लाल भालू भी कहते हैं और बर्फ के निकट रहने के कारण यह बर्फ का भालू भी कहलाता है। हमारे देश में यह भालू हिमालय के उन वर्षादि स्थानों में पाया जाता है जो कश्मीर से नेपाल तक फैले हुए हैं।



भूरा भालू

यह लगभग पाँच फुट लम्बा होता है लेकिन कोई-कोई भालू इससे भी बड़े पाये गये हैं। इनके शरीर का रंग भूरा रहता है जिसमें एक प्रकार की पीलेपन की मिलावट रहती है। कुछ के रंग में खैरेपन की भी झलक होनी है। इनके इन मुस्तलिफ रंगों का कारण यह है कि मौसम के साथ उनमें भी तबदीली होती रहती है। जाड़ों में जहाँ इनके बालों में ज्यादा सफेदी आ जाती है और वे काफी लम्बे हो जाते हैं वही गर्मियों में वे छोटे होकर गहरे रंग के हो आते हैं। इनके बाँध मोटे और मुलायम होते हैं जिनके नीचे मोटे और घने बालों की एक तह रहती है। जाड़ों में ऊपर के बाल बरीब आठ इंच लम्बे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी लम्बाई कम हो जाती है। इनके गीने पर बी (V) की शक्ल का एक सफेद निशान रहता है जो

बच्चों में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मादा के वदन का रंग नर से कुछ धूमिल होता है।

भूरा भालू अन्य भालुओं की अपेक्षा सीधा होता है और मनुष्यों पर कभी हमला नहीं करता। घायल हो जाने पर भी यह अक्सर आक्रमण करने की जगह भागना ही अधिक पसन्द करता है। इसके पंजे बहुत बड़े नहीं होते इसीलिए यह पेड़ पर चढ़ने में भी अन्य भालुओं की तरह उस्ताद नहीं होता।

भूरा भालू गरमियों में काफी ऊँचाई पर चला जाता है और प्रायः उन्हीं स्थानों पर रहता है जहाँ वर्ष जमी रहती है। पतझड़ के मौसम में यह कुछ नीचे उतर आता है और गाँव के आस-पास के बाग-वगीचों में बड़ा उत्पात मचाता है। जाड़ा शुरू होने पर यह किसी गुफा में जाकर शीतशायी हो जाता है और वसन्त के आने तक वहीं पड़ा रहता है। वसन्त के आरम्भ में जब गुफा के मुँह पर की जमी वर्ष गल जाती है तो यह बाहर निकल कर अपनी खूराक की तलाश में इधर-उधर घूमने लगता है। इसका मुख्य भोजन वैसे तो घास-पात, जड़ और फल-फूल हैं, लेकिन इसे कीड़े-मकोड़े खाने में भी हिचक नहीं होती। कभी-कभी यह भेड़-बकरियों को भी मार डालता है और कुछ लोगों ने इसको दूसरों के मारे हुए शिकार को भी खाते देखा है।

यह भालू जाड़ा शुरू होने के कुछ पहले जोड़ा बाँध लेता है। लेकिन शीतशायी होने के समय दोनों अलग हो जाते हैं। इसकी मादा अप्रैल मई के करीब दो बच्चे देती है जो शुरू में चूहे से कुछ ही बड़े होते हैं। उस समय उनके वदन पर न तो बाल ही रहते हैं और न उनकी आँख ही खुली रहती है। ये बच्चे तीन साल तक अपनी मा के साथ रहकर तब उससे अलग होते हैं। मादा हर साल नये बच्चे देती है और हर साल तीन सालवाले पुराने बच्चे उससे अलग हो जाते हैं।

काला भालू

(BLACK HIMALAYAN BEAR)

काले भालू हमारे देश में दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो रीछ के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं और जिन्हें हम अक्सर मदारियों के साथ देखते हैं और दूसरे वे जिनका यहाँ वर्णन दिया जा रहा है।

यह काला भालू भी हिमालय का निवासी है, लेकिन भूरे भालू की तरह यह बरफ के आम-पाम न रहकर घने जंगलों में रहता है। हिमालय के गारे जंगलों में ज्यादातर ये ही भालू पाये जाते हैं। जाड़ों में तो काला भालू ५,००० फुट की ऊँचाई के आम-पाम रहता है, लेकिन गरमियों में यह नीचे वारह हजार फुट की ऊँचाई तक चला जाता है।

यह भालू लगभग पाँच फुट लम्बा होता है और इसके बदन के बाल मुलायम रहते हैं। यह भूरे भालू की तरह न तो लम्बा होता है और न इसके नीचे मोटे बालों की तरह ही रहती है। इसके पंजे छोटे, मजबूत और टेढ़े होते हैं और कान भी भूरे भालू से कुछ बड़े रहते हैं। काला भालू घुर काले रंग का होता है। इसके पीने पर सफेद रंग का बी (V) गन्ध का चिह्न रहता है जिसके दोनों मारे इसके कंधे तक धले जाते हैं। इसकी ठुड्डी भी सफेद रहती है। इसकी गरदन मोठी और सिर चपटा रहता है, लेकिन इसका बदन दूसरे भालूओं से कुछ पतला और छरहरा रहता है।



काला भालू

काला भालू वैसे तो जंगलों का निवासी है, लेकिन यह आवासी के आम पाम के जंगलों में रहता ज्यादा पसन्द करता है। यह भूरे भालू की तरह सीधा नहीं होता बल्कि इसमें जगभीपन और बदमाशी की कमी नहीं रहती। यह अक्सर आदिमियों पर हमला करके उन्हें अपने तेज पंजों से मार डालता है। इसकी आँख कमजोर होती है लेकिन सूँघने की शक्ति बहुत तेज होती है। यह भागने, पड़ पर चढ़ने और तैरने में भरे भालू से ज्यादा उस्ताद होता है।

काले भालू दिन में घने जंगल में अपनी भाँद या किसी झाड़ी या खोह में पड़े रहते हैं, लेकिन रात होते ही ये अपनी सुराक के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। ये रात

भर घूम-फिरकर सघेरा होने-होने फिर अपनी मां में पहुँच जाते हैं। ये बैसे तो अकेले ही रहते हैं लेकिन जोड़ा बांध लेने पर तर-मादा साथ-साथ फिरा करते हैं।

इसका मुख्य भोजन फल, फूल, शहद और जड़ें हैं, लेकिन ये मां भी बड़े स्वाद से खाते हैं। अन्य भालुओं की तरह इनको भी दीमक बहुत पसन्द है। ये भी भूरे भालू की तरह भेड़-बकरियों का शिकार करते हैं और उसी की तरह दूसरे के मारे हुए शिकार को नहीं छोड़ते।


इसकी मादा मार्च के करीब दो बच्चे देती है जो बहुत ही छोटे रहते हैं। उनकी आँखें कुछ दिनों बाद खुलती हैं और वे कई माल तक अपनी मा के साथ रहकर फिर उसका साथ छोड़ते हैं।

रीछ

(SLOTH BEAR)

रीछ हमारे यहाँ के भालुओं में सबसे प्रसिद्ध है। यह हमारे देश में प्रायः सभी घने जंगलों में पाया जाता है। इसे हम गवने अक्सर मदारियों को नचाते देखा होगा। यह धुर काले रंग का जानवर है जिसके शरीर पर बड़े-बड़े बाल होते हैं। इसके भी सीने पर बड़ा-सा 'V' शकल का सफेद चिह्न पड़ा रहता है।

रीछ की लम्बाई लगभग पाँच-छः फुट की होती है। इसकी ऊँचाई भी करीब ढाई फुट तक पहुँच जाती है। इसका शरीर मोटी और बड़ा होता है जो सिलेटी रंग का रहता है। मादा नर से कुछ छोटी होती है।



रीछ

रीछ कद में अन्य भालुओं से बड़ा नहीं होता, लेकिन शरारत में यह उनसे कहीं

आगे रहता है। घायल हो जाने पर यह दूधने जंग में चिन्तित रहता है कि गारा जंगल में
उड़ता है। यही नहीं, यह उंग गमय अपने पिछले पंखों पर सदा होकर बड़ा भयकर
हमरा करता है और अगर कोई आदमी दूधनी पकड़ में आ गया तो यह अपने पंखों
और दाँतों से उगता मुँह और गोदोड़ी नाम डालता है। बच्चासत्री रोछनी तो अत्यन्त
ही मनुष्या पर हमला कर बैठती है। रोछ पेड़ पर चढ़ने में बहुत उम्माद होता है।
दूधनी गुनेने ही घाँवों में रहती है और यह दूध भी कम खाता है, लेकिन मूँघने की
तेजी तब घाँव में रहती है कि यह पत्ता में छिपे हुए गन्ध के छमा वा बनी आमाती
में पना लगा लेता है और ऊँच पहा पर चढ़कर भी उन्हें घट कर जाता है।

हिमालय के आठुआ की तरह रोछ भीषणायी नहीं होता। वह बाग़हा महीने
जंगल और पहाड़ों में घिरी रहता है। दिन में यह हिमी शोध में या गुहा में घुमा
रहता है लेकिन रात दिन ही अपने भाजन की तलाश में बाहर लगाने लगता है।
दूधनी मुख्य भाजन का मूल, शाद दोमर और बन्दमूल है। यह मनुष्य आम,
गन्ध और स्या भी बहुत स्वाद में खाता है। दक्षिण भारत की ओर यह तापी पीने
का गिला उँच उँच नाड और गजूर का पान। तब पर चढ़ जाता है। दीमकी के लिए
तो यह दीमकी का अपने तब पत्ता में खाइ डालता है और अपने लम्बे धूँधन का छेद
में डालकर दूधनी तजा में मुड़ता है कि बिल के गार दीमक हमने पट में पहुँच जान
ह। यह दीम का बीज-मकाड़ा का मिठा अय प्रकार का मांस नहीं खाता, लेकिन भूखा
रहने पर कभी कभी उस भी गान देगा गया है।

रोछ बैम तो अकेल ही रहता है लेकिन जन के आम-यास जाडा बाँध लेने पर
यह अकसर जाड़े में दिगार्ई पड़ता है। दूधनी मादा जाडों में दो बच्चे जनती है जो
पुत्त के बिल्ला का बग़वर हात हैं। दूध में इनकी आँखें बंद रहती हैं और इनके
गरीर के बाल छाटे और मुलायम रहते हैं। ये बच्चे कई साल तक अपनी माँ के
साथ रहते हैं।

वाह परिवार

(FAMILY PROCYONIDAE)

इस छोटे परिवार में वाह और रेकून (Racoon) आदि जीवों को एकत्र किया
गया है जिनमें के अधिक जीव हमारे देश में नहीं पाये जाते। हमारे मही केवल वाह
पाया जाता है।

इन जीवों को पेड़ पर चढ़ने की अद्भुत शक्ति प्राप्त है और इनका अधिक समय पेड़ों पर ही बीतता है। इनकी दुम काफी लम्बी होती है।

नीचे बाह का वर्णन दिया जा रहा है।

बाह

(RED CAT BEAR OR HIMALAYAN RACCOON)

बाह अपने किस्म का अकेला ही जानवर है जो हमारे यहाँ हिमालय में नेपाल से आसाम तक दस बारह हजार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है। इस जाति के और जीव हमारे देश में नहीं हैं, लेकिन इनके भाई-बन्धु अमेरिका में अवश्य पाये जाते हैं।

बाह वैसे तो भालुओं का निकट सम्बन्धी है, लेकिन शकल-सूरत में यह भालुओं से ज्यादा बिल्लियों से मिलता है। इसकी आँखें भी बिल्ली की आँखों की तरह बड़ी-

बड़ी होती हैं और कद में भी यह बिल्ली के बराबर ही होता है। इसकी लम्बाई दो फुट से ज्यादा नहीं होती और इतनी ही बड़ी इसकी दुम भी रहती है। इसके वदन का ऊपरी हिस्सा गहरा वादामी या काले रंग का होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा काला होता है। इसके चारों पैर और दुम का सिरा भी काला रहता है और दोनों आँखों के बीच



बाह

से होती हुई एक लाल पट्टी गरदन तक चली जाती है। दुम पर हलके रंग की गड़ारियाँ पड़ी रहती हैं और चेहरे, ठुड़ी और कान के बाल सफेद रहते हैं। इसके वदन के बाल काफी लम्बे होते हैं जिनके नीचे छोटे और घने बालों की एक मोटी तह भी रहती है।

बाह्र धँसे तो रात्रिचर जीव है, लेकिन यह कभी-कभी सुबह और शाम को भी दिखाई पड़ जाता है। यह अपना अधिक समय पेड़ों पर ही बिताता है और नीचे कम उतरता है। मामूली वर्ण का होता है, भी भालुओं की तरह इसे मांस बहुत कम पसन्द है और यह अपना पेट ज्यादातर फल-मूलों से भरता है। इसे घाँस के कल्ले भी बहुत पसन्द है। इसके अलावा यह चिटियों के अण्डों और बच्चों का भी बड़े भोजन में माना है।

बाह्र अक्सर जाड़े में दिखाई पड़ने है। जोड़ा बाधने का समय आने पर इनकी बिलियों-जैसी बोली बहुत तेज और कर्बश हो जाती है। उस समय नर के बदन से एक तज बू निकलता करता है। बाह्र की देखने और सुनने की शक्ति तेज नहीं होती। इन्हें पकड़ना ज्यादा कठिन नहीं होता और पकड़े जाने पर ये बड़ी आसानी से पालतू हो जाते हैं और मैदानों में भी रह लेते हैं। ये दोपहर को किसी पेड़ या छोट में घुमे रहते हैं और कभी-कभी किसी पेड़ की डाल पर ही अपना बदन समेटकर सोते रहते हैं। इनकी मादा वसन्त ऋतु में दो बच्चे देती है जो अपनी मा के साथ तब तक रहते हैं जब तक उनके दूध बच्चे नहीं हो जाते।

चित्तराला-परिवार

(FAMILY MUSTELIDAE)

चित्तराला-परिवार काफी बड़ा है जिसमें कई प्रकार के जीव एकत्र किये गये हैं। ये जीव छोटे बंद व हाँ हैं जिसका शरीर लम्बा और पूँर छोटे होते हैं।

इन जीवों में आपस में इतना भेद है कि इनको तीन उप परिवारों में बाँट दिया गया है—

- १ चित्तराला उपपरिवार—Sub Family Mustelinae
- २ मित्र उपपरिवार—Sub Family Melineae
- ३ ऊँद उपपरिवार—Sub Family Lutrinae

चित्तराला उपपरिवार

(SUB FAMILY MUSTELINAE)

चित्तराला उपपरिवार में जीव बंद में लम्बे और ऊँचाई में कम होते हैं। इनके नागून काफी तेज होते हैं और इनका शरीर कोमल और घने बालों से ढका

रहता है। ये रात्रिचारी जीव हैं जिनके तलवे का थोड़ा ही हिस्सा जमीन पर पड़ता है। ये वैसे तो मांसाहारी जीव हैं, लेकिन इन्हें मांस से ज्यादा अन्न ही पसन्द है।

इस उपपरिवार के दो प्राणी हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का यहाँ वर्णन दिया जा रहा है।

चितराला

(MARTEN)

चितराला हमारे पहाड़ी प्रदेश के बहुत परिचित जीव हैं जो वहाँ चोंधियारी की तरह सारे हिमालय प्रान्त में पाये जाते हैं। हिमालय में ये आठ हजार फुट तक काफी संख्या में फैले हुए हैं और इनके उपद्रव से वहाँ के गाँववाले बहुत परेशान रहते हैं।

यह कस्तूरी की शकल का दो फुट लम्बा जानवर है। इसके इतनी ही लम्बी झवरी दुम होती है। इसकी पीठ का रंग सफेदी मायल हलका भूरा होता है और गले का ऊपरी हिस्सा एकदम सफेद रहता है। सिर से कान के नीचे तक का हिस्सा चमकीला काला या गाढ़ा रहता है। चेहरा, दुम और चारों पैर भी इसी रंग के रहते हैं। सीने का रंग पीला या नारंगी होता है और उसके बाद नीचे का कुल हिस्सा हलका भूरे रंग का रहता है। इसके वदन के बाल काफी बड़े और मुलायम होते हैं।



चितराला

चितराला रात्रिचर जीव है, लेकिन यह अक्सर दिन में भी शिकार करता दिखाई पड़ता है। कभी-कभी जाड़ों में ये पाँच सात के गरोह बनाकर झाड़ियों और मैदानों में शिकार करते दिखाई पड़ते हैं और जरा-सा आहट पाते ही पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इसकी बोली से इसकी उपस्थिति का पता बड़ी आसानी से चल जाता है क्योंकि इधर-उधर घूमते समय यह

पग-चंग की आवाज किया करता है। परदे जाने पर यह बहुत आसानी से पालू हो जाता है। इसका मुख्य भोजन छोटे-मोटे जानवर, चिड़ियाँ और अण्डे हैं। इसके अलावा यह कीड़े-मकोड़े भी मजे में खाता है। पालू चिड़ियों और छोटे जानवरों का यह उमी नर नरमान करता है जैसे मँदाओं में बाँधियारी करती है।

इसकी मादा एक बार में कई बच्चे देती है।

कथियान्याल

(YELLOW BELLIED WEASIL)

कथियान्याल भी हिमालय का निवासी है, लेकिन यह सिर्फ नेपाल और भूटान के जंगलों में गीन हज़ार से आठ हज़ार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है और वहाँ भी गतिचर जीव होने के कारण हम इसे बहुत कम देख पाते हैं।

यह हम इंच लम्बा जानवर है जिसकी दुम चार-पाँच इंच से ज्यादा नहीं होती। इसकी शकल-मूरत चिनराले से मिलनी-जुलनी है, लेकिन यह कद में उसके आधे के

बराबर ही होता है। कथियान्याल कतई रंग का जानवर है जिसकी पीठ, चेहरा और भिर पर का ऊपरी हिस्सा तो गाढ़े कतई रंग का रहता है, लेकिन नीचे का कुल हिस्सा और टाँगा का भीतरी हिस्सा चटक पीले रंग का होता है। इसकी टुड्डी और ऊपरी हाँठ मफेदी मायल रहते हैं, लेकिन दुम, जो इसके कद को देखते हुए छोटी ही बटी जायगी, गाढ़े कतई रंग की रहती है।



कथियान्याल

कथियान्याल को नेपाल में शीकीन लोग अच्छे दामों पर खरीदकर पालते हैं क्योंकि चूहे इनमें बिल्लियों से भी ज्यादा डरते हैं। इनकी श्रित्तियों से एक प्रकार का

पीला और गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, जिसकी तेज वृं से चूहों को इनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वे घर छोड़कर भाग जाते हैं।

इनका मुख्य भोजन घैमे तो चूहे और चिड़ियाँ आदि हैं, लेकिन ये अण्डे भी बड़े भजे से खाते हैं। नेबले की तरह ये अपने से चाँगुने कदवाले धिक्कार पर दूट पड़ते हैं और उसकी गरदन में अपने तेज नाखून गड़ाकर तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक वह मर नहीं जाता।

विज्जू उपपरिवार

(SUB FAMILY MELINAE)

विज्जू उपपरिवार के प्राणी पेड़ों पर न रहकर ज्यादातर जमीन पर ही रहते हैं। इनकी चाल बहुत भद्दी होती है। इनके शरीर की बनावट गठीली होती है और कद नीचा और लम्बा रहता है। इनमें कुछ की दुम लम्बी और कुछ की छोटी होती है। इनके बाल सूखे और कड़े होते हैं और इनकी मोटी टाँगों के नख जमीन खोदने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।

ये सब रात्रिचारी जीव हैं जिनमें विज्जू और भालू-सुअर हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ इन्हीं दोनों का वर्णन दिया जा रहा है।


विज्जू

(RATEL)

विज्जू हमारे देश में काफी संख्या में फैले हुए हैं। ये हमारे यहाँ के पहाड़ी स्थानों में काफी संख्या में पाये जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के जंगलों में भी इनकी काफी संख्या है।

इनके शरीर का रंग बड़ा विचित्र रहता है जिसके कारण इन्हें पहचानने में कठिनाई नहीं होती।

इनका ऊपरी हिस्सा सिलेटी रंग का होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा और पैर काले रहते हैं। पीठ पर कुछ लम्बे और कड़े सफेद बाल रहते हैं और दुम का सिरा काला रहता है।



विज्जू

विज्जू के बारे में लोगों का यह स्याल है कि यह बत्तों को अपने मजबूत पंजों से गोद डालता है। इसका मुख्य भोजन बीटे-मनोडे, चिड़ियाँ और छोटे जानवर हैं। इसके अलावा यह शहद और फल-पूत भी बड़े स्वाद में खाता है।

विज्जू को लम्बाई करीब ढाई फुट होती है जिसमें उसकी पाँच-छ इंच लम्बी दुम शामिल नहीं है।

इसकी मादा एक घार में कई बच्चे देती है।

भालू-मुअर

(HOG BADGER)

भालू-मुअर का कही-गही बालू-मुअर भी कहते हैं। इनका भालू-मुअर नाम इस कारण पड़ा है कि इनकी शकल भालू और मुअर में मिलती जुलती होती है और इन्हें बालू-मुअर इस कारण कहा जाता है कि ये ज्यादातर नदी के किनारे के बालू के टीलों में रहते हैं।



भालू-मुअर

भालू-मुअर हमारे यहाँ हिमालय में तो पाया ही जाता है लेकिन इसके अलावा यह मध्य-प्रदेश के जंगलों में भी कभी-कभी दिखाई पड़ जाता है। वहाँ इसे चिरक-भालू कहा जाता है।

भालू-सुअर करीब ढाई फुट लम्बा और एक फुट ऊँचा जानवर है जिसके सात-आठ इंच लम्बी दुम रहती है। इसके वदन का रंग गंदा सिलेटी होता है, लेकिन पीठ का कुछ हिस्सा कलछौंह रहता है। इसके वदन के बाल छोटे और कड़े होते हैं जिनमें एक प्रकार की सफेद झलक रहती है। बगल और पीठ पर के कुछ बाल बड़े होते हैं जिनका रंग धुर काला रहता है। इसका सिर सफेद रहता है, लेकिन ऊपरी होठ के दोनों किनारों से एक-एक गाढ़ी भूरी या काली पट्टी शुरू होती है जो आँखों के ऊपर से होकर कान तक चली आती है। इसी तरह की दो धुमैली पट्टियाँ इसकी ठुड्डी से शुरू होकर इसकी आँखों के ऊपर होती हुई कान तक फैल जाती हैं। इस प्रकार इसका सिर इन पट्टियों के कारण पट्टीदार-सा जान पड़ता है। इसका सिर, गला, दुम और दोनों बगली हिस्से सफेद मायल रहते हैं। नीचे का सारा हिस्सा और चारों पैर धुमैले रहते हैं।

भालू-सुअर दिन भर पहाड़ की खोहों में या भीटों के बिलों में पड़ा रहकर वहीं आराम करता रहता है और रात में अपने भोजन की तलाश में नीचे स्थानों में चक्कर लगाता रहता है। इसका मुख्य भोजन फल-फूल, कीड़े-मकोड़े और जड़ें हैं। इसके अलावा यह केंचुए और मछली भी बड़े मजे से खाता है।

भालू-सुअर की कुछ आदतें सुअर से और कुछ भालू से मिलती-जुलती रहती हैं। भालू की तरह इसकी सूँघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और उसी की तरह यह डगमगाता हुआ चलता है। छेड़े जाने पर यह सुअर की तरह घुर-घुराता है और किसी की आहट पाने पर उन्हीं की तरह अपना थूथन ऊपर की ओर उठाकर हवा सूँघता है।

इसकी मादा एक बार में प्रायः दो बच्चे देती है।

ऊद उपपरिवार

(SUB FAMILY LUTRINAE)

तीसरा उपपरिवार ऊद का है जिसमें वह अकेला ही एक प्राणी है। यह जल और स्थल दोनों पर बड़ी आसानी से रह लेता है। इसी कारण इसको एक अलग उपपरिवार में रखना पड़ा।

ऊद पानी में मछलियों की तरह तैर लेता है लेकिन वह सूखे में बिल बनाकर

रहता है। इसका कद छोटा और लम्बा होता है और इसका सिर चौड़ा और चपटा रहता है।

इसके पैर के पंजे वस्तुओं की तरह आपस में जुटे रहते हैं जिससे इसे पानी में नैरने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। इसका मुख्य भोजन मछली है।

ऊद

(OTTER)

ऊद हमारे यहाँ का बहुत मशहूर जानवर है जो सुष्की के अलावा पानी के भीतर मछलियों की तरह तैर लेता है।

ऊद को ऊद-बिलाव भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी बिल्ली जैसी दाबल के कारण ही पड़ा है यद्यपि इसका और बिल्लियों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

ऊद हमारे यहाँ सारे देश में फैला हुआ है। यह लगभग दो फुट लम्बा जानवर है जिसके कर्गव डेढ़ फुट लम्बी दुम रहती है। इसके बदन का ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का होता है जिसमें कुछ कत्थई या ललछीह झलक रहती है। इसके बड़े बालों के नीचे घने बालों की एक सह रहती है जिसका रंग सफेदी मा-यल रहता है। इसके शरीर के नीचे का हिस्सा दुम, गला और टांगों का भीतरी हिस्सा सफेद रहता है।



ऊद

ऊद वन से हमारी बड़ी नदियों में पाये जाते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ बड़ी शीलों और तालाबों में भी रह लेते हैं। ये अपने बिल पानी के निचट ही बनाते हैं जिनमें बड़ी डार होने हैं। ऊद वन ना रात्रिचर जीव हैं, लेकिन इनको अक्सर दिन में भी

नदियों में गरोह बाँधकर शिकार करते देखा जा सकता है। यं सुनसान जगहों में ते पर घूप सेंकने के लिए लेटे रहते हैं और शिकार करते समय पाँच-सात का गरोह बना लेते हैं। ये मछलियों को किनारे के पास अर्द्ध चन्द्राकार घेर लेते हैं और उन्हें इस प्रकार घेरे में करके उनसे अपना पेट भरते हैं। इनके पैरों की उँगलियाँ जालपाद होती हैं जो वत्तखों की तरह आपस में एक मजबूत झिल्ली से जुटी रहती हैं। ये उसीसे पानी के भीतर बड़ी खूबी से तैर लेते हैं। सूखे पर भी ये बड़ी तेजी से चल-फिर लेते हैं।

ऊद बहुत ही चालाक जानवर हैं जो आसानी से नहीं पकड़े जाते, लेकिन बचपन में पकड़े जाने पर ये बड़ी आसानी से पालतू हो जाते हैं और अपने मालिक के पीछे-पीछे कुत्तों की तरह चलते हैं। यही नहीं, ये अपने मालिक के लिए पानी से मछलियाँ भी पकड़ लाते हैं।

ऊद मांसाहारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन मछली है। ये सब प्रकार का मांस, पेढक और केकड़े खाते हैं और पानी में रहनेवाली मछलियों को डुबकी लगाकर पकड़ लेते हैं। इनसे किसी प्रकार के अण्डे नहीं बचते।

ऊद शुरु जाड़ों में जोड़ा बाँधते हैं और उनकी मादा समय आने पर दो से पाँच बच्चे देती है। इन बच्चों की आँखें कुत्ते के बच्चों की तरह कुछ दिनों बाद खुलती हैं।

कीटभक्षी वर्ग

(ORDER INSECTIVORA)

इस वर्ग में वे सभी कीटभक्षी जीव एकत्र किये गये हैं जिनका कद छोटा और चूयन लम्बा होता है और जिनके मुँह में बहुत तेज और महीन दाँत रहते हैं। इन जीवों के शरीर पर नरम बाल रहते हैं, लेकिन कुछ के शरीर के बाल कड़े काँटों का रूप लेकर उनकी रक्षा के साधन बन गये हैं।

उनके पैर के नाखून या पंजे बहुत तेज होते हैं जिससे वे बड़ी आसानी से जमीन में बिल खोद लेते हैं। इनमें से अधिकांश रात्रिचारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन कोड़े-मकोड़े हैं।

यह वर्ग निम्नलिखित दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है।

१. कुत्रंग उपवर्ग—Sub Order Dermoptera

२ छट्छंदर उपवर्ग—Sub Order Insectivora vera

कुबग उपवर्ग में केवळ कुबग नाम का एक जीव हमारे यहाँ पाया जाता है लेकिन दूसरे छट्छंदर उपवर्ग में सब तरह की छट्छंदर और काँटा चूहा आदि कीटभक्षी जीव हैं। कुबग कीटभक्षी-वर्ग का हानि देने भी शक्ल-सूक्ष्म में अपने वर्ग के अन्य जीवों से इतना भिन्न है कि इसके लिए अलग कुबग उपवर्ग ही बनाना पड़ा।

कुबग उपवर्ग

(SUB ORDER DERMOPTER)

यह उपवर्ग बहुत छोटा है और इसमें केवल एक ही परिवार है जो कुबग परिवार कहलाता है।

इस उपवर्ग के प्राणियों की विशेषता यह है कि ये पड़ा पर रहते हैं और अपने बगल की बड़ी हुई झिल्ली के सहारे एक पड़ से दूसरे पड़ पर हवा में तैरते चले जाते हैं।

ये जीव कद में बिल्लिया में कुछ छोटें होते हैं और इनके पैर भी पतले और नायुक रहते हैं। इनका सिर लमछाह और दुम पतली और लम्बी रहती है।

इन प्राणियों का गल से दाना बगल की छाल बाहर की ओर काफी बड़ी रहती है जिसमें इनके चारों पैर और दुम तक का हिस्सा एक प्रकार की पतली छाल से घिरा रहता है। इसी झिल्ली या छाल को फैलाकर ये हवा में कूद जाते हैं और उड़नवाली गिलहरिया की तरह हवा में तैरते हुए साठ सत्तर गज दूर के पड़ों तक पहुँच जाते हैं।

इनके कान गोल और भीमक कद के होते हैं। पैरों का तलुवे चपटे और बिना छाल के होते हैं और पंजा का नाखून टेढ़े मुकील और घोंना ओर से दब में रहते हैं। इस उपवर्ग का एक ही प्राणी कुबग हमारे देश में पाया जाता है जो इस उपवर्ग के अकेले कुबग परिवार का जीव है।

कुबग परिवार

(FAMILY GALTSIPHIDICIDAE)

इस छोटे परिवार में कुबग जाति का कुछ जीव हैं जो अपने बगल की बड़ी हुई छाल के सहारे एक पड़ से दूसरे पड़ पर बड़ी आसानी से हवा में तैरते हुए चले जाते हैं।

ये सब रात्रिचारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन फल वगैरह है। इनके शरीर पर बहुत मृलायम रोंये होते हैं और इनका रंग पेड़ की छाल से ऐसा मिलता-जुलता रहता है कि इनके बहुत निकट चले जाने पर भी सहसा इन पर निगाह नहीं पड़ती।

इनके दांत सब जीवों से भिन्न होते हैं और नीचे के सामनेवाले दांतों की बनावट महीन कंधी जैसी होती है जिसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है।

ये जीव सुमात्रा, मलाया, श्याम, बोर्नियो आदि देशों में ही पाये जाते हैं। हमारे देश में इनकी केवल एक जाति जो कुवंग कहलाती है आसाम के पूर्वी भागों में पायी जाती है जिसका यहाँ वर्णन दिया जा रहा है।

कुवंग

(FLYING LEMUR)

कुवंग को कैवंगो भी कहते हैं। यह उड़नेवाली गिलहरी की शकल का छोटा-सा जानवर है जो अपने दोनों वगल की झिल्ली के सहारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में तैरकर चला जाता है। हमारे देश में यह पूर्वी प्रान्तों के कुछ स्थानों में ही पाया जाता है। इसके अलावा देश भर में इसे और कहीं नहीं देखा जा सकता। अपने रहने के स्थान में भी यह बहुत घने जंगलों में रहता है और केवल रात में ही भोजन की तलाश में निकलता है। इसीलिए इसको हम बहुत कम देख पाते हैं।



कुवंग

कुवंग करीब सोलह इंच लम्बा होता है जिसमें उसकी नौ इंच की दुम शामिल नहीं है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा कथई रहता है जिस पर बेतरतीबी से रुपहली और सफेद चित्तियाँ पड़ी रहती हैं।

इसके पेट का रंग भूरा होना है। बच्चों के बदन पर काफी संख्या में मफेद चित्तियाँ पड़ी रहती हैं जिसमें वे चित्तकवरे से जान पड़ने हैं।

उड़नेवाली गिलहरियों की तरह कुबग के शरीर के दोनों ओर अगले पंजों पिछले पंजों तक तीस साल फैली ही रहती है, साथ ही साथ उमकी गरदन के पास बड़ी हुई खाल भी दोनों अगले पंजों तक जुड़ी रहती है। इसी तरह पिछले पंजों में रींछे भी खाल बढ़कर इसकी दुम तक फैली रहती हैं जिसमें चारों पैरों को फैला ले पर यह पंखों की शक्ति का दिवाई पड़ने लगता है।

कुबग के बदन पर के खाल छोटे और बहुत नरम होते हैं। इसका मिर छोटा धुन नाकीला और पंजे बहुत मजबूत होने हैं। यह दिन भर या तो किसी शाल पर अपने चारों पैरों के सहारे लटका रहता है या पेड़ की डालों पर काहिली से इसपर उतर घूमता रहता है लेकिन रात आते ही इसमें गजब की तेजी आ जाती है। रात को यह अपनी श्राव के लिए एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ तक हवा में तैरता चल जाता है। हवा में तैरते समय यह चमगादड़ों की तरह अपने पैर नहीं हिलाता बल्कि उड़नेवाली गिलहरियों की तरह बगल की मिल्ली के सहारे साठ-मत्तर गज तक हवा में तैर जाता है। यह अपना पैर उम समय हिलाता है, जब इसे हवा में तैरते समय अपना रंग बदलना होता है। इसकी लम्बी दुम भी इसकी उड़ान में बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह बहुत कुछ पंखों का काम करती है। वैसे यह अपनी दुम से डालियाँ को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है जिसमें उसे पेड़ में लटकने समय बहुत सहूलियत हो जाती है।

कुबग शाकाहारी जीव है जिसका मुख्य भोजन फल-फूल है लेकिन यह कीड़े-मकोड़े भी खाता है। इसकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है।

छछूदर उपवर्ग

(SUB ORDER INSECTIVORA VERB)

छछूदर उपवर्ग काफी बड़ा उपवर्ग है जिसमें काँटे, चूड़े के अलावा सभी प्रकार की छछूदरे एकत्र की गयी हैं। इनमें में अधिकांश जीव रात्रिचारी हैं जिनका मिर छोटा होता है। इनकी आँखें और शान भी छोटे होने हैं, लेकिन इनका धुन पतला और नाकीला रहता है। ये अपने तेज नाखूनों से बिल मोड़कर जमीन में रहते हैं।

इनकी चाल अलसायी-अलसायी-सी रहती है। इनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हैं। ये स्वभाव से ही बहुत डरपोक होते हैं।

ये जीव हमारा कोई नुकसान नहीं करते बल्कि कीड़े-मकोड़ों को नष्ट करने में हमारी सहायता ही पहुँचाते हैं। इनमें से कुछ के शरीर से एक प्रकार की तेज बू निकलती रहती है जो शत्रुओं के आक्रमण से उनकी रक्षा करती है।

यह उपवर्ग वैसे तो नौ परिवारों में विभक्त किया गया है, लेकिन यहाँ केवल दो परिवारों का वर्णन दिया जा रहा है जिनमें के जीव हमारे परिचित हैं। ये परिवार हैं छछूंदर-परिवार और काँटाचूहा-परिवार।

छछूंदर-परिवार

(FAMILY SORICIDAE)

यह परिवार बहुत बड़ा है जिसमें संसार की सभी जातियों की छछूंदरें एकत्र की गयी हैं। इनका सिर चपटा और थूथन चूहों से लम्बा रहता है। इनकी आँखें बहुत छोटी होती हैं और इनकी दृष्टि इतनी कमजोर होती है कि ये सूरज की तेज रोशनी में आँखें नहीं खोल पातीं और अँधेरे में ही रहना पसन्द करती हैं। इनका वदन मुलायम रोओं से ढका रहता है और इनके दोनों बगल एक-एक गन्ध-ग्रन्थियाँ रहती हैं जिनमें से तेज बू निकला करती है। इस बू से इनकी मौजूदगी का पता फौरन चल जाता है और इसी से दुश्मनों से इनकी रक्षा हो जाती है।

इन जीवों के पैरों में पाँच-पाँच उँगलियाँ रहती हैं जिनमें तेज नाखून रहते हैं। इन मजबूत नाखूनों से ये आनन-फानन मिट्टी खोद डालते हैं।

ये सब रात्रिचारी जीव हैं जो दिन में अपने विलों में या कूड़ा-करकट के ढेरों में छिपे रहते हैं और रात को भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं।

यहाँ इस परिवार की प्रसिद्ध छछूंदर का वर्णन दिया जा रहा है जो हमारे यहाँ भारे देश में फैली हुई है।

छछूंदर

(GREY MUSK SHREW)

छछूंदर की कई जातियाँ अपने यहाँ पायी जाती हैं जिनमें से कुछ पानी में रहती हैं तो कुछ खुदकी पर, लेकिन इन सबमें हमारे घरों में रहनेवाली छछूंदर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ उसी का वर्णन दिया जा रहा है।

यह छट्ठूंदर हमारे यहाँ सारे देश में फैली हुई है और इसे हम अमर अप
में देगने हैं। रात्रिचर होने के कारण यह हमारी निगाह तले कम पजती है,
सकी चिक-चिक् की आवाज और बू से हम इसकी मौजूदगी का पता पा जाते

छट्ठूंदर शकल-मूरत और सरीर की बनावट में बहुत-बुछ चूहे की तरह ह
और दूर से देखने पर हम इसे घूहा ही समझते हैं, लेकिन इसकी तेज बू में हमें पहच



छट्ठूंदर

इसके बदन पर बहुत छोटे छोटे बाल रहते हैं, लेकिन जिम हिस्से पर बाल नहीं ह
व प्याजी या हठने गुलाबी रंग के रहते हैं। बच्चा का रंग अधिक गाढ़ा रहता है।

छट्ठूंदर चारतब में बहुत चारमीली होती है और ज्यादातर रात में ही पा
निरखती है। इसे आगामी के आग-गाम रहना बहुत भाना है और सायर ही का
ऐसा गीत बचा हागा जहाँ यह न पहुँच सगी हो। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हैं।

छट्ठूंदर के दोना बगल की गन्ध-ग्रन्थियों में एक प्रकार का बदबुदार पदार्थ
निराला किया है। ओंझ बांधने के समय यह द्रव पदार्थ और भी अधिक मात्रा में
निरखने लगाता है। तब छट्ठूंदर की बू ज्यादा नेत्र हो जाती है। यह मात्रा पदार्थ इनके
दर जाने पर ही इनकी गन्ध ग्रन्थियों में निराला है और उसका उपराग में छट्ठूंदर
में यचाय के लिए किया है। इसी नेत्र बू की वजह से इन्हें दूसरी सपु नहीं पक
और ये इसी नेत्र व में कीड़े मकोड़े का आगामी में अपने काबू में कर लेती हैं।

सरल हा जाता है।

बद छ-मात इस से

नही होता। इसके अ

इसके तीन-चार इस क

भी रहती है। इसका

लम्बा, धूपन मोकीला

नयुने ने दोनो बगल

हिस्से सूजे-सूजे में रहते

छट्ठूंदर का श

हलने मिट्टी रंग

रहता है जिसमें एक प्र

की नीली शला रहती

छछूंदर की मादा एक बार में कई बच्चे जनती है जो पैदा होने के कुछ दिनों बाद आँखें खोलते हैं।

काँटाचूहा-परिवार

(FAMILY ERINACEIDAE)

यह परिवार छछूंदर-परिवार से छोटा है और इसमें के विचित्र प्राणी अपनी शकल-सूरत से अन्य जीवों से भिन्न ही रहते हैं। इनके शरीर पर मुलायम वालों की जगह छोटे-छोटे काँटे रहते हैं जिसके कारण इनका नाम काँटाचूहा पड़ा है।

इनका धूयन छछूंदर की तरह लम्बा नहीं होता और न इनके नाखून ही छछूंदरों की तरह जमीन खोदने के लिए बनाये गये हैं। हाँ, इनकी दृष्टि जहर छछूंदरों की तरह कमजोर होती है और ये उन्हीं की तरह आलसी भी होते हैं।

इन प्राणियों की टाँगें और दुम छोटी होती हैं, लेकिन इनकी सूँघने की शक्ति बहुत तेज रहती है। ये वैसे तो काहिल से लगते हैं, लेकिन चूहे पकड़ने में विलियों से भी तेज होते हैं। चूहे ही क्यों, ये साँप तक को बड़ी आसानी से काट डालते हैं।

इनकी वैसे तो कई जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ हम अपने देश में पाये जानेवाले प्रसिद्ध काँटाचूहा का ही वर्णन दे रहे हैं।

काँटाचूहा


(HEDGE HOG)

काँटाचूहा चूहों का सम्बन्धी नहीं है, फिर भी चूहों की-सी शकल-सूरत के कारण इसे लोग चूहे की जाति का जीव समझने लगे और इसके वदन पर के कँटीले कवच के कारण इसे काँटाचूहा कहने लगे। इसके अलावा इसके और भी कई नाम हैं। कहीं इसे कण्डरना कहते हैं तो कहीं सोन्ह और सिंव की ओर यह जाही और तारजवा के नाम से प्रसिद्ध है।

हमारे देश में काँटाचूहे की कई जातियाँ हैं जिनमें थोड़ा ही भेद रहता है। यहाँ की प्रसिद्ध जाति, जिसका यहाँ वर्णन दिया जा रहा है, इस देश में पंजाब से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई है जो ज्यादातर मैदानी मैदानों में रहती है।

कांटाचूहा छ इच का छोटा-सा जानवर है जिसके बदन की ऊपरी कलछोह साल छोटे-छोटे कांटो से भरी रहती है। इसके पेट और पैर का रंग कलछोह भूरा या कसई और मुंह का हिस्सा सिलेटी भूरा रहता है। इसकी टुड्डी सफेद रहती है और वहाँ की सफेदी कभी-कभी गरदन तक फैल जाती है।

कांटाचूहे हमारे यहाँ इतनी कम सख्या में हैं कि इन्हें हम बहुत कम देख पाते हैं और यही कारण है कि इनके बारे में अभी तक ज्यादा नहीं जाना जा सका है। इनके बदन पर साही-जैसे छोटे-छोटे कांटे रहते हैं जिनका ज्यादा हिस्सा सफेद रहता है,



कांटाचूहा

लेकिन उनके भिरे की ओर का हिस्सा काला रहता है। इस काले हिस्से में भी एक सफेद छल्ला पड़ा रहता है, लेकिन कुछ कांटों की नोक काली ही रहती है।

कांटाचूहों के लिए उनके ये कांटे बड़े काम के हैं क्योंकि दुश्मनों द्वारा आक्रमण किये जाने पर ये अपना

बदन लोटकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं और अपना भिर और पैर भीतर की ओर कर लेते हैं। उस समय इनके बदन के कांटे खड़े हो जाते हैं और तब उन पर हमला करने की महत्ता किसी की हिम्मत नहीं पड़ती लेकिन इसकी भी तरकीब इनके दुश्मनों ने बूढ़ निबाली है। लोमड़ी और स्यार जब इन्हें गेदनुमा लिपटे हुए पाते हैं तो वे इन्हें गेद की तरह लुढ़काकर किसी जलाशय के पास ले जाने और वहाँ इन्हें पानी में डाल देते हैं। पानी में डाले जाने पर ये बेवम होकर अपना शरीर भीधा कर लेते हैं और तब इन्हें मारने में देर नहीं आती।

कांटाचूहा कांटे मरोटे मानेवाला जीव है जो हर तरह के कीड़े-मकोड़ों के बिना गोपा का भी मारकर खा जाता है। इस अण्ड भी बहुत पसन्द है और जमीन पर अण्ड देनेवाली चिटिया के अण्डों को इसमें बहुत मत्त रहता है।

इसकी मादा एक बार म तीन-चार बच्चे देती है जो पैदा होने पर बिना कांटे के रहते हैं लेकिन धीरे धीरे इनके बदन पर कांटे निराल आने हैं और माँ भी महीने के

वाद इनका सारा शरीर कांटों से भर जाता है। तब ये पूर्णरूप से कांटावूहा बन जाते हैं।

करपक्ष-वर्ग

(ORDER CHIROPTERA)

इस वर्ग में सब प्रकार के छोटे और बड़े चमगादड़ एकत्र किये गये हैं जो पक्षियों की तरह हवा में उड़ लेते हैं। इनके चिड़ियों की तरह पर और डीने नहीं होते, लेकिन इनके हाथ की चारों उँगलियाँ जो बढ़कर काफी लम्बी हो गयी हैं एक प्रकार की मजबूत झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। यह झिल्ली फैलकर इनकी टाँगों के पास जाकर मिलती है और जब ये अपना हाथ फैलाते हैं तो वह छाते की तरह तन जाती है। इसी के सहारे ये आकाश में पक्षियों से भी तेज उड़ लेते हैं।

इनके हाथ का अँगूठा झिल्ली से मुक्त रहता है जिसके सहारे ये दिन में पेड़ की शालियों को पकड़कर उलटे लटके रहते हैं।

इस वर्ग के प्राणियों की शकल-सूरत और कद में भले ही कुछ भेद हो, लेकिन हवा में उड़ने के गुण और शरीर-रचना के दृष्टिकोण से ये सब एक ही प्रकार के प्राणी हैं।

इनके वर्गीकरण में प्राणिशास्त्र-विशारदों को बहुत कठिनाई हुई। उन्होंने पहले इन्हें वानर-वर्ग में रखा, लेकिन बाद में ये मांसाहारी वर्ग में रखे गये। उसके बाद वहाँ से हटाकर इन्हें कीटभक्षी-वर्ग में रखा गया, लेकिन अन्त में विद्वानों ने इनका यह अलग ही वर्ग बनाया जो करपक्ष-वर्ग कहलाता है।

वानर-वर्ग की तरह यह वर्ग भी दो उपवर्गों में बाँट दिया गया है—

१. गादुर उपवर्ग—Sub Order Megachiroptera

२. चमगादड़ उपवर्ग—Sub Order Microchiroptera

पहले उपवर्ग में फलाहारी और दूसरे में मांसाहारी चमगादड़ हैं। फलाहारी गादुर और मांसभक्षी चमगादड़ कहलाते हैं जिनके कई परिवार और अनेक जातियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं।

अपनी मजबूत झिल्ली के कारण चमगादड़ और गादुर आकाश में भले ही चिड़ियों की तरह उड़ लेते हों, लेकिन उनके जमीन पर चलने में यही झिल्ली बाधक

होती है और ये बड़ी मुश्किल से घसिट-घसिटकर जमीन पर चल पाते हैं। इतना ही नहीं, इसी झिल्ली के कारण एव बार जमीन पर उतर पड़ने पर वे फिर जल्द हवा में नहीं उठ पाते और उड़ने से पहले उन्हें कुछ दूर तक जमीन पर घसिट-घसिटकर चलना पड़ता है। इसी कारण ये या तो किसी पेड़ पर लटके रहते हैं या किसी ऊँची जगह पर बिलो या सूरसो में घुसे रहते हैं जहाँ से कूदकर उन्हें हवा में उड़ने में आसानी हो जाती है।

चमगादड़ रात्रिचारी जीव हैं जो रात होने पर अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। इनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं जिनसे वे शायद काम भी नहीं लेते क्योंकि उनका ज्यादा काम उनकी झिल्ली में चलता है। उनकी झिल्ली में गजब का स्पर्शज्ञान रहता है जिसके द्वारा उन्हें उड़ते समय आम-यास की चीजों का पता चल जाता है और वे अँधेरे में बिना किसी चीज से टकराये हवा में उड़ते रहते हैं।

चमगादड़ों की सूँघने और सुनने की शक्ति भी कम नहीं होती। इनकी मादा प्रतिवर्ष एक ही बच्चा देती है जो काफी समय तक अपनी पिछली टांगों से मा के पेट को ज्वाल पकड़कर लटका रहता है।

गादुर उपवर्ग

(SUB ORDER MEGACHIROPTERA)

गादुर उपवर्ग में बड़े कद के फलाहारी जीव हैं जिनका मुँह लोमड़ी की तरह लम्बा होता है। इनके दुम नहीं रहती और रहती भी है तो बहुत छोटी। इनके पांव भी छोटे होते हैं।

ये जीव गादुर कहलाते हैं और इनका एक ही परिवार गादुर-परिवार है।

गादुर-परिवार

(FAMILY PLEROPODIDAE)

गादुर-परिवार में बड़े कद के फलाहारी गादुर हैं जो जुड़ में रहने हैं। इनमें कुछ का धूपन लम्बा और कुछ का छोटा रहता है। दिन में ये किसी एक पेड़ पर लटके रहते हैं और रात में इनका फलों के बाग पर भयबर हमला होता है। इनकी उड़ान बहुत लम्बी होती है। इस परिवार में अनेक जातियों के गादुर हैं जिनमें से एक प्रसिद्ध गादुर का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।


गादुर (FRUIT BAT)

गादुर फल खानेवाले बड़े कद के चमगादड़ हैं जो हमारे देश में प्रायः सभी स्थानों में पाये जाते हैं। कहीं इनकी संख्या कम रहती है तो कहीं ज्यादा, लेकिन ऐसा शायद ही कोई स्थान होगा जहाँ ये कभी न दिखाई पड़ते हों। हमारे देश में ये पंजाब में बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। राजपूताने की ओर भी इनकी संख्या बहुत कम है और हिमालय की ओर तो ये तराइयों को छोड़ ऊपर की ओर जाना पसन्द ही नहीं करते।

गादुर वैसे तो देखने में कलछाँह या कलथई जान पड़ते हैं, लेकिन उनका शरीर अनेक रंगों में बँटा रहता है। उनके सिर और गुद्दी का रंग ललछाँह भूरा रहता है और नयुने गाढ़े रंग के होते हैं जो कभी-कभी काले से दिखाई पड़ते हैं। गरदन का ऊपरी हिस्सा और कंधा सुनहलापन लिये पिलछाँह रहता है। इनका गला ठुड्ढी और नीचे का सारा हिस्सा पिलछाँह भूरे रंग का होता है और शरीर के दोनों ओर की झिल्ली भूरापन लिये काले रंग की रहती है।

इनका शरीर वैसे तो एक फुट से ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनकी लम्बी उँगलियों में मढ़ी हुई दोनों वगल की उड़नेवाली झिल्ली का फैलाव चार फुट तक पहुँच जाता है।

गादुर फलाहारी जीव हैं जो झुंड के झुंड दिन भर किसी पेड़ पर उलटे टँगें रहने के बाद शाम होते ही एक-एक करके उड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे सारा पेड़ खाली हो जाता है। रात भर इनका फलों के बागों पर हमला होता रहता है और सबेरा होते-होते ये फिर अपने उसी पुराने पेड़ पर सैकड़ों की तादाद में आकर लटक जाते हैं। फलों की तलाश में ये रात में सौ-सौ मील का चक्कर



गादुर

लगा डालते हैं और जिम बाग पर इनका ठीक में हमला हो जाता है उसे साफ हो समझना चाहिए।

गादुर नींबू, नारंगी और बड़े छिलकेवाले फलों को छोड़कर सभी प्रकार के फल खाते हैं। बेंला, अमरुद आदि मीठे और गूदेदार फल के तो ये जानी दुश्मन हैं। इसके अलावा मूलर, पीपल और पावड आदि जगली फल भी इनमें नहीं बचते। सभी-सभी तो ये खजूर और नाइ में लटकते हुए पत्तों से छाड़ी भी पी लेते हैं।

गादुर की मादा एक बार में एक ही बच्चा जनती है। बच्चा जब तक काफी बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह अपनी माँ के पेट पर पिछली टाँगों के सहारे उल्टा लटका रहता है।

चमगादड़ उपवर्ग

(SUB ORDER MICROCHIROPTERA)

चमगादड़ उपपरिवार गादुर उपपरिवार से कहीं बड़ा है जिसमें अनेक परिवार और जातियाँ हैं, लेकिन इसमें के सभी चमगादड़ कीटभक्षी जीव हैं जो बंद में भी गादुरों में छोटे होते हैं। इनमें से कुछ लम्बी पूँछवाले होते हैं तो कुछ लम्बे कानवाले। कीड़े-मकोड़ों के अलावा इनमें से कुछ दूसरे जानवरों का खून चूमने में भी उस्ताद होते हैं।

इनके बैसे तो अनेक परिवार हैं, लेकिन यहाँ केवल (१) चमगादड़ परिवार, (२) छोटा चमगादड़ परिवार और (३) चमगिदड़ी परिवार का वर्णन दिया जा रहा है।

चमगादड़-परिवार

(FAMILY MEGADERMIDAE)

इस परिवार में कई प्रकार के चमगादड़ हैं जिनकी विशेषता उनके लम्बे कान हैं। ये बंद में बहुत बड़े नहीं होने और इनकी श्रुण बहुत छोटी होती है। ये बैसे तो सिलेटी भूरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनके रंग में पिटछौंह शलक भी आ जाती है। यहाँ इसी परिवार के एक प्रसिद्ध चमगादड़ का वर्णन दिया जा रहा है।



चमगादड़

(VAMPIRE BAT)

चमगादड़ों की हमारे यहाँ अनेक जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध लम्बकर्ण चमगादड़ का वर्णन दिया जा रहा है क्योंकि रंग-रूप में कुछ भेद होने पर भी न सक्की आदतों में ज्यादा भेद नहीं रहता ।

हमारे यहाँ यह लम्बे कानवाला चमगादड़ सारे देश में फैला हुआ है । उत्तर से और यह जरूर हिमालय के पहाड़ों पर नहीं जाता और इसके रहने के मुख्य स्थान तराइयों तक ही सीमित रहते हैं ।



चमगादड़

यह चमगादड़ कद में तीन-चार इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसके बगल की झिल्ली का फैलाव भी एक से डेढ़ फुट तक रहता है । इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा राखी या सिलेटी रहता है, लेकिन नीचे का रंग हलका रहता है । नीचे के हलके रंग में कभी-कभी सफेदी या पीलेपन की झलक रहती है और उड़ने की झिल्ली गाढ़े भूरे रंग की रहती है ।

लम्बकर्ण चमगादड़ के वदन के बाल काफी मृलायम और लम्बे होते हैं । उसका कान काफी लम्बा होता है जिसका बाहरी हिस्सा गोलाई लिये रहता है । इसकी नाक पर पत्ती की शकल का उभार-सा रहता है । अपने लम्बे कान और उभरी-उभरी पत्तीदार नाक के कारण इसकी शकल अजीब मसखरों-सी जान पड़ती है ।

ये चमगादड़ अपना दिन का समय पुरानी इमारतों, बैवरी बोठरियों, दीवार के सूरानों और दगजों में खिताते हैं जहाँ ये हजारों की गणना में छिपे रहते हैं, लेकिन शाम होने ही से बाहर निकलकर अपने भोजन की तलाश में आकाश में उड़ने लगते हैं। पुरानी बीगन इमारतों में, जहाँ ये रहते हैं, काफी बंदरू रहती है और इनके रहने का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती।

ये चमगादड़ मामाहारी जीव हैं जिनका मुख्य भोजन बँसे तो रखत है, लेकिन इसमें अगवा ये कीड़े-मकोड़े, मेहन और छोटी-छोटी चिड़ियाँ भी बड़े सजे में लाते हैं। यही नहीं, ये कभी-कभी छोटे-छोटे जानवरों और चमगादड़ों को भी खा जाते हैं, अन्य मामभक्षी जीवों की तरह ये अपने शिकार को समूचा या टुकड़े टुकड़े करते नहीं माने बल्कि उसे पसटर अपने लम्बे कानों के बीच में दबा लेते हैं और उड़ते ही उड़ते उसका गून चूसकर उसे छोड़ देते हैं।

इनकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है जो बड़ा होने तक अपनी मा के पेट पर उगता लटका रहता है।

छोटा चमगादड़-परिवार

(FAMILY RHINOLOPHIDAE)


इस परिवार में छोटे चमगादड़ों को एकत्र किया गया है जिनकी विशेषता उनकी लम्बी बुनियाँ जैसी कुम है। इनकी यह कुम इनकी शिरी में बाहर की ओर निकली रहती है। नाक के ऊपर पत्ती के शरल का माम भी उभरा रहता है। ये प्रायः बड़े-बड़े शृङ्ग में पुरानी इमारतों और बीगन खंडहरों में घुसे रहते हैं। इनकी बँग ता कई जानियों है, लेकिन यहाँ अपने यहाँ के एक प्रसिद्ध छोटे चमगादड़ का वर्णन दिया जा रहा है जो अपनी बुनियाँ-जैसी कुम के लिए मगार में मगहर है।

छोटा चमगादड़

(HOLSTATHID BAT)

छोटे चमगादड़ हमारे यहाँ काफी गणना में पाये जाते हैं और इन्हें हम अपने देश में प्रायः सभी स्थानों पर देख सकते हैं। हिमालय पर जहाँ ये ज्यादा उँचाई पर नहीं पाये जाते।

यह हमारे यहाँ का छोटा दुमदार चमगादड़ है जिसकी लम्बाई करीब तीन इंच के होती है। इसकी झिल्ली का फैलाव लगभग एक फुट रहता है और इसकी दुम भी करीब दो इंच लम्बी रहती है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा कभी कल्यई रहता है तो कभी भूरा और कभी-कभी इसी भूरेपन में पीले या सिलेटीपन की झलक भी रहती है। पेट का रंग अक्सर गंदा पीला या गंदा सफेद रहता है।



छोटा चमगादड़

इस चमगादड़ के कान बड़े नहीं होते। इसका नथुना मोटा पत्तीनुमा, सिर चौड़ा और चेहरा चपटा रहता है। इसके शरीर के बाल छोटे और मुलायम रहते हैं।

इसको जैसे जंगल पसन्द नहीं आते और यह अपना ज्यादा समय वस्तियों के आस-पास ही बिताता है। दिन में यह किसी पुरानी धीरान इमारत में या अँधेरी कोठरियों और दरारों में छिपा रहता है, लेकिन शाम होते ही यह सब चमगादड़ों से पहले बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है।

इसका मुख्य भोजन वैसे तो कीड़े-मकोड़े हैं लेकिन दीमक इसे सबसे अधिक पसन्द आता है। इसकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है जो अन्य चमगादड़ के बच्चों की तरह मा के पेट पर उलटा लटका रहता है।

चमगादड़ी-परिवार

(FAMILY VESTERTILIONIDAE)

इस परिवार में और भी छोटे कद के चमगादड़ हैं जो चमगादड़ी कहलाते हैं। इनकी पाँच-छः जातियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो चमगादड़ी पायी जाती है वह तीन इंच से बड़ी नहीं होती। इसके छोटी-सी दुम भी होती है जो इनकी झिल्ली के

भीतर ही रह जाती है। इससे कान उतने बड़े न होकर आगे की ओर मुड़े रहते हैं। नीचे उसी का वर्णन दिया जा रहा है।

चमगिदड़ी

(NOCTULE BAT)

इस छोटे चमगादड़ को इसके छोटे कद के कारण लोग चमगिदड़ी कहने लगे हैं। हमारे देश में यह नेपाल के आम-ग्राम दिखाई पड़ती है। इसकी और भी कई जानियाँ हैं जो देश के अन्य स्थानों में फैली हुई हैं।

चमगिदड़ी तीन इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होती, जिसके लगभग दो इंच लम्बी छुम रहती है जो इसके वदन की शिल्ली से बाहर नहीं निकलती। इसकी शिल्ली



चमगिदड़ी

का फैलाव लगभग एक फुट का रहता है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा हल्का पिलछौंह भूरा रहता है और नीचे का हिस्सा हल्के रंग का रहता है जिसमें हल्की पीली झलक रहती है। इसका सिर चौड़ा और चपटा रहता है। कान छोटे, थोड़े और गोलाई लिये रहते हैं जो बहुत छोटे और मोटे होते हैं। इसके पैर मोटे और छोटे होते हैं और उड़नेवाली शिल्ली पैर का कुछ हिस्सा छोड़कर गुरु होती है।

चमगिदड़ी दिन में अन्य चमगादड़ों की तरह किसी पुराने मकान के अंधेरे हिस्से में या किसी पेड़ के गोखे में छिपी रहती है जो शाम होने ही अपने

छिपने की जगह से निकलकर हवा में काफी ऊँचाई पर उड़ने लगती है। इसकी

उड़ान तेज रहती है। इसे वस्त्रियों से ज्यादा जंगल पसन्द हैं, जहाँ यह रात भर अपने भोजन की तलाश में उड़ती रहती है। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकड़े हैं।

जाड़ा प्रारम्भ होते ही चमगिदड़ी शीतघात्री हो जाती है और जाड़े भर किसी निरापद स्थान में सोती रहती है। जाड़ा खतम होने पर इसकी कुम्भकर्णी नींद खतम होती है और तब यह फिर केवल दिन में ही सोना पसन्द करती है।

इसकी मादा एक बार में एक ही बच्चा देती है।

वानर वर्ग

(ORDER PRIMATES)

इस वर्ग के अन्तर्गत सभी प्रकार के वनमानुष, बन्दर, लंगूर और लजीले वानर आते हैं, लेकिन सुविधा के लिए इस वर्ग को दो उपवर्गों में विभक्त कर दिया गया है।

१. लजीला वानर उपवर्ग—Sub Order Lemuroidea

२. वानर उपवर्ग—Sub Order Anthropoidea

इनके विषय में खास-खास बातें आगे दी जायेंगी। यहाँ तो पूरे वर्ग को ध्यान में रखकर ही कुछ बातें दी जा रही हैं।

वानर वर्ग के अधिकांश जीवों के शरीर पर बाल रहते हैं और उनके छोटी या बड़ी दुम होती है, लेकिन वनमानुषों के दुम नहीं रहती। उनके मुख में चारों किस्म के दाँत, कृन्तक, कुकुरदन्त, दूध की दाढ़ें और दाढ़ें (Incisors, Canines, Premolars & Molars) रहती हैं जो पहले दूध के दाँत गिर जाने पर निकलती हैं। उनकी आँख, हड्डी की परिधि के भीतर रहती है जिससे वह सुरक्षित रह सके।

उनके पेट की भीतरी वनावट सादी रहती है। कंधे की हड्डी स्पष्ट रहती है और हाथ की दोनों बड़ी हड्डियाँ रेडियस (Radius) और अलना (Ulna) कभी एक में जुटी नहीं रहतीं। उनके हाथ और पैर में प्रायः पाँच-पाँच उँगलियाँ रहती हैं जिनमें नाखून रहते हैं; अँगूठा अन्य उँगलियों से छोटा रहता है।

इन जीवों की खोपड़ी तो बड़ी होती है। साथ ही साथ उनका मस्तिष्क भी बहुत विकसित रहता है। प्रायः सभी की मादा की छाती पर दो स्तन रहते हैं जिनसे वे

अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं। इसी विशेषता के कारण इन जीवों को स्तनप्राणी अथवा स्तनपायी जीव कहा जाता है। इनके शिशु पैदा होने के बाद कुछ दिनों तक बड़ी अमहाय अवस्था में रहते हैं और तब उन्हें अपनी माता पर ही आश्रित रहना पड़ता है।

इस वर्ग के प्राणी मारे समार में फँसे हुए हैं।

लजीला वानर उपवर्ग

(SUB ORDER LEMUROIDEA)

इस उपवर्ग में लेमूर तथा लजीले वानर की जाति के जीव हैं जो विक्रम क्रम में वानरों से पिछड़े जीव माने जाते हैं।

इनका मुख वानरों की तरह गोल न होकर कुत्तों की तरह लम्बा रहता है और वान भी बटुधा लम्बे होते हैं। किमी की दुम बड़ी और किमी की छोटी होती है और कुछ ऐसे भी हैं जो किना दुम के ही होते हैं। कुछ की छात्तियों पर स्तन होते हैं तो कुछ के पेट पर और कुछ ऐसे हैं जिनकी छाती और पेट दोनों स्थानों पर स्तन रहते हैं। इनकी आँखें आगे की ओर उभरी रहती हैं जो काफी तेज होती हैं।

इन जीवों के पैर की उँगलियों में से दूसरी में तेज नख रहता है और इनके हाथ की अगली दोनों हड्डियाँ एक ही में जुटी रहती हैं।

इस उपवर्ग के प्राणी अफ्रीका, भारत, स्याम, मेडागास्कर, लवा, मलाया, आनाम तथा फिलीपाइन आदि देशों में पाये जाते हैं जो तीन परिवारों में विभक्त किये गये हैं, लेकिन यहाँ केवल एक लजीला वानर परिवार का ही वर्णन दिया जा रहा है।

लजीला वानर परिवार

(FAMILY LORISINAE)

इस परिवार में कई जातियाँ के जीव हैं जिनकी विशेषता उनके शरीर के मुलायम वाला की तरह है। इनकी आँखें बड़ी होती हैं। कुछ की दुम छोटी होती है तो कुछ घेदुम के होते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं। यहाँ अपने यहाँ के प्रसिद्ध लजीला वानर तथा सवागु का वर्णन दिया जा रहा है।


लजीला वानर

(SLOW LORIS)

लजीला वानर बड़े तो वानरों का भाई-बन्धु है, लेकिन इसकी शकल-मूरत में बन्दरों में इतना फर्क रहता है कि कुछ लोग इसे दूसरी जाति का प्राणी समझते हैं। यही कारण है कि कहीं-कहीं इसे शरमीली-बिल्ली भी कहा जाता है।

लजीला वानर हमारे देश में केवल आनाम में पाया जाता है। इसके सिवा यह इस देश में और कहीं नहीं मिलता। पूर्वी पाकिस्तान में जहाँ यह काफी संख्या में पाया जाता है, जहाँ में यह बोनियों तक देख पड़ता है।

लजीला वानर बिल्ली से भी छोटा, परन्तु उसमें अधिक गठीले वदन का जानवर है जो आकार में चौदह-पन्द्रह इंच से बड़ा नहीं होता। इसका धूयन लोमड़ी की तरह और आँखें बिल्लियों की तरह होती हैं। इसके कान तो छोटे होते ही हैं, लेकिन दुम भी इतनी छोटी होती है कि वह बालों में ही छिपी रहती है। इसके शरीर



लजीला वानर

का रंग सिलेटी रहता है जिसमें कुछ ललाई मिली रहती है। नीचे का हिस्सा हल्के रंग का रहता है। इसकी गुद्दी से लेकर पीठ तक का हिस्सा भूरे रंग का होता है और आँखों के चारों ओर इसी रंग का एक घेरा-सा पड़ा रहता है। आँखों के बीच में एक सफेद खड़ी धारी-सी रहती है।

लजीला वानर घने जंगलों में रहनेवाला जानवर है जो हमेशा पेड़ों पर ही रहता है। इसे जमीन पर उतरना बिलकुल पसन्द नहीं है। अगर इसे जमीन पर रखा जाय

ता यह अजीब तरह से लहराता हुआ चलता है। यह वैसे तो सुस्त जानवर है, लेकिन पेड़ों पर चढ़ने के समय इसमें बहुत कृती आ जाती है। दिन में यह किसी पेड़ के डाल पकड़कर अपना सिर भीतर की ओर कर लेता है और गोल गेद सा होकर मारवाकन सोने में बिता देता है। शाम होते ही इसकी निद्रा टूटती है, तब यह इस पेड़ से उस पेड़ पर अपने भोजन के लिए चक्कर लगाने लगता है। इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकाड़ा छोटे जानवरों और चिड़ियों के अलावा फल फूल भी हैं। केला इसे बहुत ही पसन्द है।

इसकी मादा एक बार में एक ही घच्चा देती है।

तवागु

(*SLENDER LORIS*)

तवागु लजीला धानर का भाई बन्धु है जो कद में उससे छोटा होता है। हमारे देश में यह केवल दक्षिण भारत के जंगल में पाया जाता है। इसके अलावा यह दक्षिण

भारत में और कहीं नहीं देखा जा सकता। इसे कहीं तामिल में तो तवागु कहते हैं, लेकिन तेलंगाना में देवागु पिल्ली कहते हैं।



तवागु

तवागु का कद आठ इंच से बड़ा नहीं होता। इसकी बांहें पाँच इंच की और पैर मात्र पाँच के रहते हैं। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा सिलेटी रंग का रहता है जिसमें खैरेपन की मिश्रणवट रहती है। नीचे का हिस्सा हल्का हो जाता है। इसके माथे पर एक सफेद

निशाना-सा चिह्न रहता है जिसका नीचे का भाग नाक तक चला आता है। इसने बाँह छोटे घने और मुलायम रहते हैं। कान पतल और गोलाई लिये रहते हैं।

तवांगु भी लजीला वानर की तरह दिन भर सोने के बाद रात में पेड़ों पर अपने भोजन के लिए चक्कर लगाने लगता है। सोते समय यह भी अपना सिर अपने पेट में घुमेड़कर सोता है। यह जमीन पर शायद ही कभी उतरता हो क्योंकि जमीन पर ठीक से यह भी नहीं चल पाता।

इसका भोजन फल-फूल, नरम कल्ले, कीड़े-मकोड़े, अण्डे और छोटे-मोटे पशु-पक्षी हैं।

वानर उपवर्ग

(SUB ORDER ANTHROPODEA)

इस उपवर्ग में लजीले वानरों को छोड़कर सब तरह के वनमानुष, लंगूर और बंदर रखे गये हैं जिनके मुख्य-मुख्य गुणों के बारे में ऊपर लिखा ही जा चुका है।

इस उपवर्ग को कई मुख्य परिवारों में बांटा गया है जिनमें से वानर-परिवार (Family Cercopithecidae) तथा ऊलक-परिवार (Family Simiidae) के कुछ जीवों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है।

वानर-परिवार

(FAMILY CERCOPITHECIDAE)

वानर-परिवार काफी बड़ा परिवार है जिसमें सब तरह के बंदर और लंगूर रखे गये हैं। इनकी अनेक जातियाँ सारे संसार में फैली हुई हैं जिनसे हम इतने परिचित हैं कि उनके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं है।

हमारे देश में भी इनकी बहुत-सी जातियाँ हैं, लेकिन यहाँ केवल अपने एक प्रसिद्ध बंदर और लंगूर का ही वर्णन दिया जा रहा है।

इन दोनों से हम सभी परिचित हैं। बंदरों के गाल में एक थैली होती है जिसमें वे फल और अनाज भर लेते हैं, लेकिन लंगूरों में इस थैली का अभाव रहता है। वैसे इन दोनों की आदतें बहुत कुछ मिलती-जुलती होती हैं।

बंदर

(MONKEY)

बंदर हमारे इतने परिचित जीव हैं कि इनके बारे में ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर भी इनका थोड़ा-बहुत हाल देना आवश्यक है जिससे इनके स्वभाव आदि के बारे में कुछ जानकारी हो जाय।

लगूर और बदरो की शकल-मूरत में ही नहीं, रंग में भी काफी भेद रहता है। न तो बदरा की दुम ही लगूरो की तरह लम्बी होती है और न इनका चेहरा ही उनकी तरह काला होता है। ये तो सुनहले भूरे रंग के होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा गहरा और नीचे का हलका रहता है। इनके चेहरे पर और बैठक की जगह पर बाल नहीं होते और ये दोनों हिस्से लाल रहते हैं जो उनकी उम्र के साथ ही साथ चटक होते जाते हैं। बुढ़े होने पर यह ललाई सारे चेहरे पर फैल जाती है।

बदर हमारे देश के उत्तरी भाग में काफी मख्या में फैले हुए हैं। ये वैसे तो दक्षिण भारत को छोड़कर सारे देश में पाये जाते हैं, लेकिन सीर्यस्थानों में इनकी काफी बड़ी मख्या देखी जा सकती है। हिमालय में ये पाच छ हजार फुट से ज्यादा ऊँचाई



बदर

पर बहुत कम जाते हैं। इनका कद लगभग बीस इंच का होता है जिसमें इनकी दस-ग्यारह इंच की दुम शामिल नहीं है।

बदर कद में लगूरो से छोटे होते हैं। इनका मुख्य भोजन वैसे तो फल है, लेकिन ये राटी, मिठाई गल्ला और हर किस्म का पका हुआ खाना खा लेते हैं। यही नहीं, ये कीड़े-मकोड़े और अण्डे भी बड़े मजे में खाते हैं।

बदर बहुत गुस्मैल होते हैं और दबाव में पड़ने पर बड़े जोर से काट लेते हैं। ये बड़े उत्पाती होते हैं। इनके ऊपम से तो कभी-कभी जो ऊव जाता है। ये हमारे खेतों और बागों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं।

इनके बारे में हम लोग स्वयं इतना जानते हैं कि उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

इनकी मादा या बेंदरिया एक बार में एक ही बच्चा देती है जो मा के पेट से तब तक चिपका रहता है जब तक बड़ा नहीं हो जाता।

गल्ला, कीड़े मकोड़े और अण्डे भी खाते हैं। वस्तियों में रहनेवाले लंगूर तो पका हुआ खाना और मिठाई आदि भी बड़े स्वाद से खाने लगे हैं।

इनकी मादा एक बार में एक बच्चा देती है जो बदर के बच्चे की तरह मा के पेट पर कुछ समय तक चिपका रहता है।

नील वानर

(LION TAILED MONKEY)

नील वानर दक्षिण भारत का निवासी है। इसके अलावा यह और कहीं नहीं पाया जाता। कहीं-कहीं इसे स्याह बदर भी कहते हैं। यह कद में लगभग दा फुट का होता है और इसका करीब दस इंच लम्बी दुम रहती है। मादा नर से कद में कुछ छोटी होती है।

नील वानर के कंधे पर और चेहरे के चारों ओर बखर-शेर की तरह घने बाल रहते हैं जिससे इसका चेहरा बहुत रोबोला जान पड़ता है। इसकी दुम के सिरे पर भी

सिंह की दुम की तरह बालों का गुच्छा-सा रहता है।



नील वानर

सा रहता है जो मर्बदी मायल रहता है।

स्याह बदर मोल बनावर रहता है जिसमें प्रायः पन्द्रह में घने और ऊँच पत्तों के जंगल-प्रपादा पसन्द हैं। यह शकल-भूगत

नील वानर काले रंग का बदर है जिसके चेहरे के चारों ओर सिल्टी रंग के घने बाल होते हैं। इसका सीने का रंग हलका होता है जो बचपन में भूरा रहता है। इसके सिर पर बालों का एक गुच्छा-

२३४

। इन
४९

भी बहुत नीचा और धरमीला जानवर है जो मनुष्यों की आदृष्ट पाकर छिपना ही ज्यादा पसन्द करता है। पकड़े जाने पर यह जरूर गुम्मा दिखाता है और इसी ने इसे पालनू करना आमान काम नहीं।

इसके नर की बान्सी मनुष्यों से मिलती-जुलती होती है जो अक्सर जंगलों में दूर से सुनाई पड़ती है। इसका भोजन भी अन्य बंदरों की तरह फल-फूल, गल्ला, अण्डे और कीड़े मकोड़े हैं।

इनकी मादा एक बार में एक बच्चा देती है।

ऊलक-परिवार

(FAMILY SIMIIDAE)

ऊलक-परिवार में हमारे यहाँ के केवल दो गिबन (Gibbon) जाति के वन-मानुष रचे गये हैं जिनमें पहला ऊलक (White browed Gibbon) तो हमारे देश का प्राणी है, लेकिन दूसरा उंकाइटम (White handed Gibbon) हमारे देश की पूर्वी सीमा पर कभी-कभी आ जाता है। इन दोनों में बहुत समता रहती है और दोनों का रंग-रूप और स्वभाव भी बहुत कुछ मिलता-जुलता रहता है।

ये वैसे तो पेड़ों पर रहनेवाले जीव हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर भी झुककर चल लेते हैं। बंदरों की तरह न तो इनके गाल में थैली होती है और न इनके दुम ही रहती है।

इनका मस्तिष्क मनुष्यों को छोड़कर अन्य जीवों से अधिक विकसित रहता है और इनकी खोपड़ी मनुष्यों से बहुत कुछ मिलती-जुलती होती है। नर वनमानुषों के कुकुरदन्त बड़े और तेज होते हैं।

हमारे देश में बड़े वनमानुष नहीं पाये जाते। यहाँ तो सिर्फ ऊलक जाति के छोटे वनमानुष पाये जाते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

ऊलक वनमानुष

(WHITE BROWED GIBBON)

हमारे देश में गोरिला, शिम्पैजी और ओरांग उटांग आदि बड़े वनमानुष नहीं पाये जाते, लेकिन यहाँ गिबन (Gibbon) जाति के दो वनमानुष जरूर मिलते हैं जो छोटे वनमानुषों की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों वनमानुषों में पहला ऊलक या

हुकू हमारे यहाँ बहुत असम के जंगल में पाया जाता है लेकिन दूमरा उवाइटम (White handed Gibbon) मलाया का निवासी है जो कभी-कभी हमारे देश में असम प्रदेश के जंगल में आ जाता है। इन दोनों का कद और स्वभाव



ऊलक

बहुत कुछ एक जमा होता है। इसमें यहाँ केवल ऊलक का वणन दिया जा रहा है जो हमारे देश का निवासी है। यह वनमानुष धुर काल रंग का होता है जिसकी दाँतों में भी एक-एक आली सफ़ाई पड़ी रहती है लेकिन मलायावासी वनमानुष के दाँतों में हाथ धाँसी दूर तक सफ़ाई रहते हैं।

ऊलक असम के जंगल का निवासी है जो घन पहाड़ी जंगल में ही रहना पसंद करता है और पेड़ की एक डाली में झूलकर दूसरी पर आता जाता रहता है। ऊलक गरोह में रहनेवाला जान

वर है लेकिन कभी-कभी इसके नर अवल भी दिखाई पड़ते हैं। इसके शुरु कभी-कभी माँ-माँ तक के हो जाते हैं जो सुबह शाम इतना गोर भूँसाते हैं कि दूर से ही इनकी रहने की जगह का पता चल जाता है। सुबह होते ही इनका बागना शुरू हो जाता है जो नौ-दस बज तक जारी रहता है। इसके बाद वे अपने भोजन की तलाश में लग जाते हैं और खा-पीकर शाम तक आराम करते हैं। शाम को फिर इनकी बगना बोली से एक बार सारा जगह गुँज उठता है।

ऊलकों का ज्यादा समय पैरों पर ही बीतता है, लेकिन खाने-पीने के लिए ये जमीन पर भी उतरते हैं। जमीन पर ये बन्दरों की तरह चारों पैरों से न चलकर आदमियों की तरह दोनों पैरों पर सीधे होकर चलते हैं। इस प्रकार चलते समय ये अपने चौड़े पंजे की उँगलियाँ फैलाकर अपने शरीर को साध कर चलते हैं, लेकिन इनकी यह चाल ज्यादा तेज नहीं होती और इन्हें आदमी आसानी से दौड़कर पकड़ सकता है।

ऊलक बहुत जल्द पालतू हो जाता है, लेकिन इसकी सुबह-शाम शोर मचाने की आदत के कारण इसे पालना लोग पसन्द नहीं करते। चिड़ियाखानों में भी जहाँ ऊलक पले रहते हैं वहाँ मीलों तक के लोग इनकी आवाज से इनकी मौजूदगी का पता पा जाते हैं।

इनका मुख्य भोजन एकदम शाकाहार नहीं है। अपनी फल-फूल की खुराक के अलावा ये छोटी-मोटी चिड़ियाँ, अण्डे और कीड़े-मकोड़े भी खाते हैं। मकड़ियाँ तो इन्हें खास तौर से पसन्द हैं। ये आदमियों की तरह चुल्लू से पानी न पीकर बंदरों की तरह झुककर पानी पीते हैं।

इनकी मादा एक बार में एक ही वच्चा देती है।

